

Азидин-вет

Азидин-вет — для лечения и профилактики крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, собак и кошек при наличии возбудителей кровопаразитарных болезней (бабезиозов и тейлериоза).

СОСТАВ

1 г препарата содержит действующее вещество: диминазена ацетурат — 438 мг, который по химическому составу представляет ди-(4-амидофенил)-триазен-(N-1,3)-диацетурат.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Азидин-вет при парентеральном введении в организм непосредственно действует на паразитов родов *Babesia* и *Tytraposoma*, одновременно проявляет антибактериальные свойства относительно стрептококков, стафилококков, бруцелл и тому подобное.

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактика и терапия кровопаразитарных болезней крупного рогатого скота, верблюдов, лошадей, овец, коз, свиней, собак и кошек, а именно: бабезиозов и трипаносомоза (су-ауру верблюдов и лошадей).

ДОЗИРОВАНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Азидин-вет применяют в виде 7% водного раствора, который вводят внутримышечно или подкожно. Для сельскохозяйственных животных терапевтическая доза составляет 3,5 мг диминазена ацетурат на 1 кг массы тела, что отвечает — 1 мл на 20 кг массы тела (по 7% раствору). Если после введения такого количества препарата общее состояние больного животного не улучшилось, то через 24-30 часов, препарат вводят повторно в такой же дозе.

При появлении первых случаев заболевания всем животным стада (группы, отары), с профилактической целью, препарат вводят из расчета 1 мл/40 кг.

При лечении собак, содержимое флакона растворяют двойным объемом воды, получая 3,5% раствор, который вводят из расчета 0,1 мл на 2 кг массы тела, а спустя сутки — повторно в такой же дозе.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Воспалительные процессы в почках.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

После введения препарата крупному рогатому скоту, у отдельных животных наблюдается беспокойство, гиперсаливация, полиурия. Как антидот применяют 40% раствор глюкозы (внутривенно) и раствор кофеина (подкожно).

Забой животных на мясо допускается через 20 суток, а употребление молока в еду — через 3 суток после последнего введения препарата.

ФАСОВКА

Стекланные флаконы по 0,24; 2,4 и 24 г. Для разведения соответственно применяют 1,25; 12,5 или 125 мл воды для инъекций. Объем 7% раствора при этом будет составлять: 1,5; 15 или 150 мл.

ХРАНЕНИЕ

В темном месте при температуре от 1 до 25° С.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/azidin-vet/>