

Ампикол

Преимущества:

- Эффективен против широкого спектра микроорганизмов
- Мощная комбинация против *E. coli*
- Не вызывает токсических явлений при передозировке
- Отлично растворяется в жесткой воде

СОСТАВ

1 г препарата содержит действующие вещества:

- колистина сульфат — 1 200 000 МЕ;
- амоксициллина тригидрат — 200 мг;
- вспомогательные вещества — до 1 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Комбинация амоксициллина и колистина имеет синергическое действие.

Колистин — антибиотик из группы полимиксинов, имеет бактерицидное действие на грамотрицательные микроорганизмы (например, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Bordetella spp.*). Колистин всасывается в кишечнике в небольшом количестве, поэтому эффективно действует при желудочно-кишечных инфекциях. Выделяется, в основном, с калом.

Амоксициллин — полусинтетический антибиотик из группы пенициллинов, широкого спектра действия. Имеет бактерицидное системное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы (например, *E. coli*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Clostridium spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*). Механизм действия обусловлен нарушением синтеза клеточной стенки микроорганизмов. Легко всасывается в кишечнике. Выделяется, в основном, в неизменном виде с мочой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение заболеваний органов желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии у телят, козлят, ягнят, свиней и птицы.

ДОЗИРОВАНИЕ

Телята, козлята, ягнята — перорально дважды в день 5 г на 100 кг массы тела на протяжении 3 — 5 дней. Птица, свиньи — 1 кг на 1000 л питьевой воды на протяжении 3 — 5 дней.

Вода с препаратом должна быть единственным источником питьевой воды на протяжении периода лечения!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять животным, чувствительным к компонентам препарата, животным с поражениями почек. Не применять вместе с пенициллинами, тетрациклином, макролидами, линкомицином. Не применять животным с развитыми преджелудками и птице, яйца от которой предназначены для питания людей.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции, нейротоксичность, структурные изменения почек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Препарат не назначают в субтерапевтических дозах и животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ (КАРЕНЦИИ)

Мясо: 8 суток. В зависимости от вывода врача ветеринарной медицины, до указанного срока мясо скормливают непродуктивным животным, или утилизируют.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из пленочных или фольгованных материалов 1000 г.

ХРАНЕНИЕ

В заводской упаковке в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5 до +25 °С. Срок годности 2 года. Срок годности рабочего раствора препарата — 24 час

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/ampicol/>