

# Бетаминт

*Бетаминт — раствор для орального применения, на основе ментола, для снижения симптомов теплового стресса. Кормовая добавка в форме раствора для орального применения, предназначенная для повышения сохранности и продуктивности свиней и сельскохозяйственной птицы.*

## СОСТАВ

В 1 л кормовой добавки Бетаминт в качестве действующих веществ содержится: бетаин — 250 г, витамин С — 90 г, хлорид калия — 2 г, гексагидрат хлорида магния — 4 г, дигидрат хлорида кальция — 40 г, натрия хлорид — 20 г, а в качестве вспомогательных компонентов: тиоглицерол — 10 г, неогесперидин дигидрохалкон — 40 мг, ментол — 5 г, краситель (синий патентованный V) — 25 мг, дистиллированная вода — до 1 л.

## БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Бетаминт, являющийся комбинацией натуральных веществ, оптимизирует физиологические функции организма и нормализует обмен веществ. Бетаин выступает в качестве метилового донора, необходим для синтеза креатина, фосфатидилхолина, карнитина, адреналина и пурина. Бетаин действует как осморегулятор, улучшая усвояемость питательных веществ, снижая диарею и последствия теплового стресса. Аскорбиновая кислота для животных ослабляет или способствует исключению отрицательного влияния стресс-факторов, профилактирует С-гиповитаминозы, способствует сохранности молодняка и повышению продуктивности. Участвует в превращении нуклеиновых кислот, в обмене аминокислот, серы и железа, в синтезе стероидных гормонов в надпочечниках, в образовании коллагена, входящего в состав основного вещества (эндотелия) сосудов и соединительной ткани. Влияет на инактивацию в организме ядов и токсинов и обладает антиоксидантным действием. Микроэлементы улучшают перистальтику и повышает усвояемость пищи, обладает желчегонными свойствами.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Бетаминт рекомендуется применять свиньям и сельскохозяйственной птице в неблагоприятные периоды жизни для снижения влияния стрессовых факторов (теплового стресса) и нормализации обмена веществ, а также для стимуляции аппетита и улучшения усвояемости пищи, улучшения работы печени и почек.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАНИЮ

Кормовую добавку применяют всем видам сельскохозяйственной птицы и свиньям групповым (через систему автопоения) или индивидуальным способом с водой для поения в течение 5-7 суток.

При снижении влияния тепловых стрессовых факторов, повышения сохранности и продуктивности свиньям кормовую добавку применяют в дозе 1-2 л Бетаминта на 1000 л питьевой воды.

При необходимости курс введения увеличивают до 10-15 суток.

В промышленном птицеводстве для снижения отрицательного действия теплового стресса, стресса, вызванного вакцинацией, применением антибиотиков или кокцидиостатиков, Бетаминт применяют птице в дозе 1 л/т воды для поения в течение 3 суток до стресса и 3 суток после него.

При планируемой перегруппировке или транспортировке птицы кормовую добавку применяют в той же дозе в течение 2 суток до стресса и 3 суток после него.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Противопоказаний не установлено

## **ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ**

Побочных явлений и осложнений при применении Бетаминта в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Кормовая добавка совместима с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами. Продукцию от сельскохозяйственной птицы после применения кормовой добавки Бетаминт можно использовать в пищевых целях без ограничений.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранят Бетаминт в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C. Срок хранения — 2 года со дня изготовления.

## **СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА**

1, 5, 25 л.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/betamint/>