

Бофлокс

- Высокая бактерицидная активность без негативного влияния на организм животного;
- Лечение острых форм маститов, вызванных *E. coli* у КРС, и лечение синдрома ММА у свиней;
- Широкий спектр действия при лечении респираторных патогенов;
- Отличная биодоступность (приблизительно 100%);
- Достигает максимальной концентрации в плазме крови в течение 1 часа;
- Каренция на молоко лишь 36 часов

СОСТАВ

Марбофлоксацин — 100 мг.

Растворитель до 1 мл.

НАЗНАЧЕНИЕ

КРС: лечение животных при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами (*Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* и *Histophilus somni*), а также больных на острый мастит, вызванный *E. coli*, чувствительными к марбофлоксацину.

Свиньи: лечение животных, больных синдромом метрит—мастит—агалактии, а также при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительных к марбофлоксацину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Крупный рогатый скот в дозе: при лечении инфекции органов дыхания, вызванных чувствительными штаммами *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* и *Histophilus somni*, внутримышечно в дозе 8 мг марбофлоксацина на 1 кг массы тела (2 мл препарата на 25 кг массы тела) однократно.

При лечении острого мастита, вызванного штаммами *E. coli* внутримышечно или подкожно в дозе 2 мг марбофлоксацина на 1 кг массы тела, что эквивалентно 1 мл препарата на 50 кг массы тела один раз в сутки. Курс лечения составляет 3 суток. Первое введение также могут провести внутривенно. Если объем дозы превышает 20 мл, его необходимо разделить и ввести в две и более участков.

Свиньи: внутримышечно в дозе 2 мг марбофлоксацина на 1 кг массы тела или 1 мл препарата на 50 кг массы тела один раз в сутки. Курс лечения составляет 3 суток.

Крупному рогатому скоту и свиньям препарат следует вводить в область шеи. Для правильного определения дозы необходимо точно измерить массу тела (на сколько это возможно), чтобы избежать введения недостаточной дозы. Крышечку флакона можно безопасно прокалывать 30 раз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять Бофлокс животным с известной повышенной чувствительностью к фторхинолонам или другим компонентам препарата. Не использовать, если определен патогенный микроорганизм, устойчивый к другим фторхинолонам (перекрестная устойчивость).

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Крупный рогатый скот: 8 мг/кг однократно (ВМ): Мясо: 3 суток; Молоко: 72 часа.
2 мг/кг в течение 3 или 5 суток (ВВ, ПШ, ВМ): Мясо: 6 суток, Молоко: 36 часов.

Свиньи (свиноматки): Мясо 4 суток

Беременным животным допускают применение препарата только после тщательной оценки соотношения польза/риск ответственным врачом ветеринарной медицины.

ХРАНЕНИЕ

Бофлоркс следует хранить в темном, сухом, недоступном для детей месте при температуре от +5°C до +25°C

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

После первого отбора из флакона препарат необходимо использовать в течение 28 суток, при условии хранения в темном месте при температуре от +2°C до +8°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы по 100 мл та 250 мл

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/boflox/>