

Цеправин DC

Цеправин DC – суспензия для интрацистернального введения.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Цеправин DC в 1 шприце содержит в качестве действующего вещества 250 мг цефалониума (в форме дигидрата) и вспомогательные вещества.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальные препараты. Цефалониум — имеет широкий спектр бактерицидного действия в отношении многих Гр+ и Гр-, аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных бактерий.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цеправин DC применяют для профилактики (одномоментный запуск) и лечения маститов у коров в сухостойный период. Вводят однократно интрацистенально не позднее чем, за 54 дня до предполагаемого отела. С профилактической целью (одномоментный запуск) лекарственный препарат вводят в каждую четверть вымени сразу после последней дойки перед запуском. Перед применением лекарственного препарата, четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют сосок. Затем удаляют верхушку колпачка, вводят наконечник в молочный канал на 5 мм или полностью удаляют колпачок и вводят наконечник в сосковый канал на длину наконечника, затем содержимое шприца вводят в четверть вымени соска и массируют четверть вымени. Удаляют шприц, пережимая верхушку соска и массируют четверть вымени.

ДОЗИРОВКА

Препарат вводят с лечебной целью однократно в пораженные четверти вымени в дозе 1 шприц-дозатор на одну четверть не менее, чем за 54 дня до предполагаемого отела.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Молоко можно использовать в пищу через 7 суток после отела, если отел произошел не ранее чем через 40 дней после введения препарата. Молоко, полученное ранее этого срока, кипятят и утилизируют. Убой животных на мясо разрешен не раньше, чем через 21 сутки после последнего применения Цеправина DC. Вымя в пищевых целях можно использовать не ранее, чем через 47 дней после введения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применять Цеправин DC коровам в период лактации, а также при гиперчувствительности к цефалоспорином и другим β-лактамам антибиотикам

Купить → <http://vetlikar.com/shop/protivomastitnye-i-protivoyendometri/cepravin-dc/>