

Джотрил 10%

- Противомикробное средство системного действия, имеющее в своем составе энрофлоксацин
- Лечение колибактериоза, сальмонеллеза, микоплазмоза, бронхопневмонии, энтеритов и других заболеваний телят, ягнят, козлят и птицы, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину
- Препарат обладает бактерицидным действием против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов

СОСТАВ

1мл препарата содержит действующее вещество:

- энрофлоксацин – 100 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Энрофлоксацин принадлежит к группе фторхинолонов нового поколения, он препятствует синтезу ДНК в ядрах клеток микроорганизмов и предотвращает, таким образом, развитие параллельной резистентности. Препарат имеет бактерицидное действие против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corinebacterium spp.*, *Pseudomonas*, *E.coli*, *Haemophilus*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.* и прочие), а также действует против микоплазм и хламидий. Препарат быстро и почти полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация энрофлоксацина в плазме достигается через 0,5-2 часа после применения Джотрила и сохраняется на протяжении 3-4 часов, а терапевтическая концентрация – на протяжении 24 часов. Не вызывает кросс-резистентности. Энрофлоксацин выделяется из организма в неизменном виде с мочой и желчью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение колибактериоза, сальмонеллеза, микоплазмоза, бронхопневмонии, энтеритов и других заболеваний телят, ягнят, козлят и птицы, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к фторхинолонам.

ДОЗИРОВАНИЕ

Перорально.

- Молодняк жвачных – 1 мл на 20 кг живой массы на протяжении 3-4 дней, в первый день задают половину дневной дозы;
- Птица – 10 мг на 1 кг живой массы тела (100 мл на 200 л питьевой воды) на протяжении 3 суток. При сальмонеллезе и стафилококковой инфекции курс лечения составляет 5 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять животным, чувствительным к фторхинолонам, а также лошадям и молодым собакам. Одновременно не применять с макролидами, сульфаниламидными препаратами, хлорфениколом. Не применять курам-несушкам, яйца которых предназначены в пищу людям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Забой животных на мясо разрешается через 5 дней после последнего применения препарата. До указанного срока мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют (в зависимости от вывода ветврача).

ФОРМА ВЫПУСКА

Пластиковые флаконы по 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ

Сухое, темное место при температуре от +15 до +30°C.

Срок годности – 3 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/jotril-10-oral/>