

Флимабенд

Флимабенд — антигельминтный препарат широкого спектра применения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торговое наименование лекарственного препарата: Флимабенд (Flimabend).

Международное непатентованное наименование: флубендазол.

Лекарственная форма: суспензия для орального применения.

Флимабенд в качестве действующего вещества в 1 г содержит флубендазол — 100 мг, и вспомогательные вещества: кармеллоза натрия, ксантановая камедь, моногидрат лимонной кислоты, карбомеры, динатрия эдетат, метилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, бензоат натрия, вода очищенная.

Лекарственный препарат представляет собой суспензию от белого до кремового цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения — 3 года с даты производства. Срок годности лечебного раствора — 24 часа. Запрещается применение Флимабенда по истечении срока годности.

Флимабенд выпускают расфасованным по 100 г в пакеты-саше из алюминиевой фольги соответствующей вместимости, которые помещаются в коробки, содержащие 5 пакетов. Каждую единицу упаковки снабжают инструкцией по применению.

Флимабенд следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 25°C.

Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флимабенд относится к антигельминтным препаратам группы бензимидазола.

Флубендазол — действующее вещество Флимабенда — активен против нематод, паразитирующих у свиней, таких как *Ascaris suum*, и паразитирующих у птиц: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria* spp.

Механизм действия флубендазола заключается в нарушении энергетического метаболизма и микротубулярной функции нематод, что приводит их к гибели.

После перорального применения препарата флубендазол плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Выводится препарат преимущественно в неизменном виде с фекалиями, небольшая часть препарата абсорбируется и подвергается биотрансформации в печени, в последствии выводится в виде метаболитов с желчью и мочой. Период полувыведения флубендазола из организма свиней и птиц составляет от 12 часов до 2 суток.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Флимабенд назначают с лечебной и профилактической целью для гельминтизации свиней, цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур и кур-несушек при нематодозах желудочно-кишечного тракта.

12. Противопоказанием к применению Флимабенда является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Флимабенд применяют свиньям и птице с водой для поения групповым способом. Цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур и курам-несушкам — в дозе 14,3 мг препарата (1,43 мг флубендазола) на 1 кг массы животного или 1 г на 70 кг массы животных в течение 7 дней.

Свиньям на откорме, пороссятам, супоросным и лактирующим свиноматкам для лечения аскаридоза, вызванного интестинальной личиночной и взрослой формами аскарид, применяют Флимабенд в дозе 10 мг (1 мг флубендазола) на 1 кг массы или 1 г на 100 кг массы животного в течение 5 дней.

Свиньям на откорме, пороссятам, супоросным и лактирующим свиноматкам для лечения аскаридоза, вызванного взрослой формой аскарид, применяют Флимабенд в дозе 25 мг (2,5 мг флубендазола) на 1 кг массы или 2,5 г на 100 кг массы животного в течение 2 дней. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество препарата ниже приведена формула:

мг препарата на кг массы в день	X	Средняя масса (кг) животных	=	мг препарата на литр питьевой воды
среднее количество воды для поения (л) на животное, потребляемое в течение 4 часов				

Лечебный раствор готовят ежедневно. Требуемое количество препарата предварительно растворяют в небольшом количестве воды для поения. Предварительный раствор добавляют к количеству воды обычно потребляемому животными в течение 4 часов. Все животные в группе должны получить достаточное количество воды для поения с препаратом. Препарат необходимо задавать в промежуток времени, когда потребление воды животными максимальное. Для стимуляции жажды рекомендуется лишить животных воды на 2 часа до применения лечебного раствора.

При значительной передозировке у животного может наблюдаться диарея.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Препарат применяют без ограничений супоросным и лактирующим свиноматкам, пороссятам, курам-несушкам, предназначенным для воспроизводства стада и цыплятам.

Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные лекарственные средства и симптоматическое лечение.

Нежелательное взаимодействие с другими препаратами не установлено.

Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 2 суток после применения препарата в дозе 10 мг на кг массы животного в течение 5 дней, и не ранее, чем через 4 суток при применении препарата в дозе 25 мг на кг в течение 2 дней. Убой цыплят-бройлеров и кур на мясо разрешается не ранее, чем через 1 сутки после последнего введения препарата. Яйца в период и после применения препарата в пищу употребляются без ограничений. Мясо свиней и птиц, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с Флимабеном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к флубендазолу следует избегать прямого контакта с Флимабеном. При случайно попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/flimabend/>