

Флосан 4% орал

Оральный раствор

- Эффективен против большинства грамотрицательных и, особенно, грамположительных микроорганизмов
- Антимикробная активность выше в 2,5-5 раз, чем у ближайшего аналога хлорамфеникола (левомицетина)
- В отличие от левомицетина имеет низкую токсичность
- Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта
- Эффективен в тех случаях, где другие антибиотики бессильны

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующие вещества:

- фторфеникол – 40 мг;
- вспомогательные и формообразующие вещества – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фторфеникол – синтетический антибиотик, производный тиамфеникола, с широким спектром действия. Механизм его действия связан с угнетением активности фермента пептидилтрансферазы микробной клетки, в особенности на участке 70 S рибосом. Фторфеникол эффективен против *Pasteurella sp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Salmonella sp.*, *Escherichia sp.*, *Proteus sp.*, *Haemophilus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Shigella sp.*, *Klebsiella sp.*, *Enterobacter sp.*, *Aeromonas salmonicida*, *Campylobacter sp.*, *Edwardsiella ictaluri*, *Edwardsiella tarda*, *Flexibacter sp.*, *Vibrio sp.*, а также против микоплазм. После перорального приема фторфеникол хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и распределяется в организме.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат Флосан 4% орал применяют для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, обусловленных бактериальной микрофлорой, чувствительной к фторфениколу:

Свиньи: плевропневмония, атрофический ринит, гласерова болезнь, гемофилез и другие болезни, которые вызваны чувствительными к фторфениколу микроорганизмами.

Птица: колиинфекции и прочие кишечные заболевания инфекционной этиологии, пастереллез, заболевания респираторного тракта и другие болезни, которые вызваны чувствительными к фторфениколу микроорганизмами.

ДОЗИРОВАНИЕ

Свиньи:

Перорально с кормом или питьевой водой (применяют для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, повышения сохранности поголовья и эффективности кормления): 1,5-2 мг фторфеникола на 1 кг массы тела в день (3,75-5 мл препарата Флосан 4% орал на 100 кг массы тела). Продолжительность лечения 7 дней. Флосан 4% орал задают в неразведенном виде или растворяют в воде в соотношении не менее 20 л воды на 1 л препарата.

Птица:

С питьевой водой (применяют для лечения инфекционных заболеваний): 20 мг фторфеникола на 1 кг массы тела в день или 50 мл препарата на 100 кг массы тела на протяжении 3-5 дней. Флосан 4% орал задают через медикатор в неразведенном виде или растворяют в воде в соотношении не менее 20 л воды на 1 л препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применяют животным, чувствительным к препарату, супоросным свиноматкам, животным в период лактации, а также птице, яйца которой идут в пищу человеку. Не применять одновременно с тиамфениколом и хлорамфениколом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Маточный раствор готовят в соотношении не менее 20 л воды на 1 л препарата. Препарат не назначают в субтерапевтических дозах и животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Изменение цвета фекалий, диарея, покраснение или припухлость анальной или ректальной области, которые исчезают после отмены препарата.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо и внутренние органы свиней и птицы – 2 суток.

ХРАНЕНИЕ

В заводской упаковке в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре от +5 до +25°C. Срок годности – 2 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/flosan-4/>