

Ингельвак МикоФЛЕКС

Ингельвак МикоФЛЕКС — для профилактики микоплазменной инфекции у свиней инактивированной

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лекарственная форма — суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из культуры *M. hyorheumoniae* (штамм J), инактивированной формальдегидом, с добавлением вспомогательного компонента, карбомера, в количестве 1 мг в изотоническом растворе хлорида натрия.

По внешнему виду Ингельвак МикоФЛЕКС представляет собой равномерную, слегка опалесцирующую суспензию от розового до коричневого цвета.

Вакцина расфасована по 10 см³, 20 см³, 30 см³, 50 см³, 100 см³ и 250 см³ (10, 20, 30, 50, 100 и 250 прививных доз) в полиэтиленовые флаконы соответствующей вместимости. Флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с вакциной упаковывают в картонные коробки. В каждую коробку с вакциной вкладывают инструкцию по ее применению. Коробки с вакциной упакованы в ящики (или другую транспортную упаковку).

Срок годности вакцины — 21 месяц с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2°C до 8°C. Замораживание вакцины не допускается.

Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки вакцины, не использованные в течение 5 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработке 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней к микоплазмозу, вызываемому *M. hyorheumoniae*, через 14 сут после однократного применения продолжительностью 6 месяцев. Каждая доза вакцины содержит от 1 до 4.61 RU (относительных единиц) специфического микоплазменного антигена.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИН

Вакцина Ингельвак МикоФЛЕКС предназначена для профилактики энзоотической пневмонии, вызываемой *M. hyorheumoniae*,

в неблагополучных и угрожаемых по данной болезни репродукторных и товарных свиноводческих хозяйствах.

Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных.

Вакцинации подлежат животные, начиная с 21 суточного возраста до начала первого репродуктивного цикла. Вакцину вводят однократно внутримышечно в область шеи за ухом в объеме 1 см³ с соблюдением общепринятых правил асептики и антисептики.

Вакцину перед применением выдерживают в течение 3 часов при комнатной температуре (15-25°С) и непосредственно перед введением тщательно встряхивают. Шприцы и иглы стерилизуют кипячением. Поверхность кожи на месте введения вакцины дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом. При вакцинации для каждого животного используют отдельную стерильную иглу.

Симптомов проявления микоплазменной инфекции или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

Особенностей поствакцинальной реакции при первичной иммунизации не установлено.

Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики энзоотической пневмонии свиней. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. После применения вакцины у свиней иногда возможно кратковременное (в течение первых суток) повышение температуры тела до 40,5°С, не требующее медикаментозного вмешательства. При возникновении в единичных случаях анафилактических реакций рекомендуется симптоматическое лечение животных препаратами адреналина.

Запрещается применение вакцины Ингельвак МикоФЛЕКС одновременно с другими иммунобиологическими препаратами, за исключением вакцины от цирковирусной инфекции Ингельвак ЦиркоФЛЕКС производства «Бёрингер Ингельхайм Ветмедика». Вакцины могут быть смешаны в соответствующих дозах для применения животным при непосредственном введении. Другие биопрепараты могут применяться только через 14 суток после применения Ингельвак МикоФЛЕКС.

Продукты убоя и мясо от вакцинированных животных реализуют без ограничения, независимо от сроков вакцинации.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты — очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

К участию в проведении вакцинации не допускаются лица с признаками респираторных, желудочно-кишечных, кожных и аллергических заболеваний.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды.

В случае разлива вакцины зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или едкого натра. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/vakciny-dlya-sviney/ingelvak-mikofleks/>