

Кловермакс 10%

Раствор для инъекций.

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество:

- клозантел — 100 мг;

Вспомогательные вещества: вода для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ATCvet QP52A, противотрематодные, противонематодные и противоцестодные ветеринарные препараты

Клозантел, входящий в состав препарата, является производным салициланилида, имеет широкий спектр противопаразитарного действия, активен в отношении неполовозрелых и половозрелых фаз развития нематод (*Haemonchus*, *Nematodirus*, *Trichostrongylus*, *Ostertagia*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*, *Chabertia*), трематод (*Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Dicrocoelium lanceatum*, *Eurytrema pancreaticum*), личинок оводов крупного и мелкого рогатого скота (*Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* и *Oestrus ovis*). Механизм действия клозантела заключается в угнетении окислительного фосфорилирования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактика и лечение крупного рогатого скота, овец и коз при нематодозах, трематодозах и гиподерматозах, вызванных *Haemonchus*, *Nematodirus*, *Trichostrongylus*, *Ostertagia*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*, *Chabertia*, *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*, *Dicrocoelium lanceatum*, *Eurytrema pancreaticum*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum* и *Oestrus ovis*.

ДОЗИРОВКА

Препарат вводят животным однократно с соблюдением правил асептики и антисептики в следующих дозах:

- **крупному рогатому скоту** — 0,5 мл/20 кг (2,5 мг клозантела / кг), внутримышечного или подкожно при нематодозах и фасциолезе, при гиподерматозе, вызванном личинками 2 стадии — 1,0 мл / 20 кг (5 мг клозантела / кг)
- **овцам и козам** — 0,5 мл / 20 кг массы тела (2,5 мг клозантела / кг), при нематодозах и эстрозах, при фасциолезе — 1,0 мл/20 кг массы животного (5 мг клозантела / кг), подкожно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата самкам в период лактации и в период беременности за месяц (30 суток) до родов.

Не использовать ослабленным, истощенным и больным инфекционными болезнями животным, а также одновременно с фосфорорганическими лекарственными средствами.

Препарат не назначают в субтерапевтических дозах и животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

С целью предотвращения болевой реакции, максимальный объем препарата для введения в одно место не должен превышать для взрослого крупного рогатого скота — 20 мл, овец, коз и телят — 10 мл.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ (КАРЕНЦИЯ)

Забой животных на мясо разрешается через 28 суток после последнего применения препарата. При вынужденном забое ранее установленного срока, мясо утилизируют или скармливают непродуктивным животным зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы по 100 мл.

ХРАНЕНИЕ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 до 25 ° С.
Срок годности — 3 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/clovermax-10/>