

# Колистин 6М

*Водорастворимый порошок*

Водорастворимый порошок, имеющий в своем составе колистина сульфат  
Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии у телят, ягнят, поросят и птицы

Препарат оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные бактерии

## СОСТАВ

1 г препарата содержит действующее вещество:

- колистина сульфат – 6 000 000 МЕ.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Колистин 6 М– антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спорообразующей палочкой *Bacillus polymyxa*. Он бактерицидно действует на грамотрицательные бактерии (*E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.* и др.). Колистин 6М связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает ее проницаемость как для внутри- так и для внеклеточных компонентов, что ведет к деструкции клеток бактерии. Препарат всасывается из желудочно-кишечного тракта в маленьких дозах. Выводится из организма преимущественно фекалиями.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии у телят, ягнят, поросят и птицы.

## ДОЗИРОВАНИЕ

Перорально.

**Телята, ягнята** – 0,1 г препарата на 10 кг живой массы тела на день на протяжении 3-6 дней;

**Птица** – 100-200 г на 1000 л питьевой воды на протяжении 3-5 дней;

**Поросята** – 100 г на 500-700 л питьевой воды на протяжении 3-6 дней.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять животным, чувствительным к колистину, а также животным с заболеваниями почек.

Не применять одновременно с другими противомикробными препаратами.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Забой животных на мясо разрешается через 3 дня после последнего применения препарата. До указанного срока мясо скармливают непродуцирующим животным или утилизируют (в зависимости от вывода ветврача).

## ФОРМА ВЫПУСКА

Пластиковые флаконы по 1000 г.

## ХРАНЕНИЕ

Сухое, темное место при температуре от +15 до +30°C. Срок годности – 36 месяцев.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/colistin-6m/>