

# Комбистресс

Комбистресс — препарат для седации и анальгезии лошадей и других животных.

## СОСТАВ

- Ацепромазин малеат 20 мг
- Наполнитель до 1 мл.

## СВОЙСТВА

Ацепромазин является деривативом фенотиазина и имеет седативные, спазмолитические и противорвотные свойства.

## ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, собаки, кошки.

## ПОКАЗАНИЯ

В качестве преанестетика вместе с общими анестетиками. Назначать Комбистресс за 15-20 минут перед применением общих анестетиков.

Для нейролептаналгезии вместе с анальгетиками.

Для транквилизации или успокаивающего действия неуправляемых животных (возбужденные, раздражительные, агрессивные животные) и перед различными процедурами и лечением (напр., вместе с местными анестетиками).

Спазмолитик: спазматические колики у лошадей.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В комбинации с эпидуральной анестезией местными анестетиками (усиление действия гипотензии).

Интоксикация (конвульсии) стрихнином и тетаном.

Гиповолемическая анемия и гиповолемический шок

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Рекомендуется вводить КОМБИСТРЕСС жеребцам только внутримышечно и придерживаться самой низкой из возможных дозировок для предупреждения паралича сокращающих мышц пениса.

С осторожностью нужно лечить брахицефалические выводки собак. В случае общего ослабления, кардинального нарушения и заболеваний печени необходимо назначать сниженную дозировку.

## СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКИ

КОМБИСТРЕСС назначается путем глубокого внутримышечного, подкожного (малые животные) или медленного внутривенного введения при следующих дозировках:

**Лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы:** 0.05 мг/кг или 0.125 мл/50 кг массы тела I.V.  
0.05-0.1 мг/кг или 0.125-0.25 мл/50 кг массы тела I.M.

**Свиньи:** 0.05-0.1 мг/кг или 0.125-0.25 мл/50 кг массы тела I.V.  
0.1-0.2 мг/кг или 0.25-0.5 мл/50 кг массы тела I.M.

**Собаки, кошки:** преанестетики: 0.1-0.2 мг/кг или 0.1-0.2 мл/20 кг массы тела I.M., S.C.  
успокоительное действие: собаки: 0.2-1 мг/кг или 0.2-1 мл/20 кг массы тела I.M., S.C.

**Кошки:** 1-2 мг/кг или 0.2-0.4 мл/4 кг массы тела I.M., S.C.

## ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо, молоко: 24 часа.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре (15-25°C) и защищать от света.

## УПАКОВКА

флакон-ампула 50 мл

Купить → <http://vetlikar.com/shop/sedativnye-preparaty/kombistress/>