

Крем-эмульсия ДЕ

Крем-эмульсия ДЕ (200 г) — лечение мастита, эндометрита, проктита, заболеваний кожи (дерматиты), слизистых оболочек, ожогов, ран.

СОСТАВ

100 г препарата содержит действующие вещества:

- диоксидин — 0,1 г;
- декаметоксин -0,1 г;
- этоний -0,5 г;
- витамин А — 0,015 г.

Другие ингредиенты: натрия тетраборат, эмульгатор, масло вазелиновое, глицерин, вода дистиллированная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Декаметоксин имеет широкий спектр антимикробного действия. Активный по отношению к грамположительным и грамотрицательным микроорганизмам: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* с множественной стойкостью к антибиотикам; к бактериям (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus vulgaris*, *Proteus morgani* и прочие), дрожжеподобным грибам (*Candida albicans*, *Candida crusei* и другие), простейшим (Protozoa и другие), вирусам, некоторым дерматомицетам (*Trichophyton spp.*, *Microsporum spp.*). Действует бактерицидно, спороцидно, фунгицидно. Диоксидин — антимикробное вещество широкого спектра действия. Эффективный против микроорганизмов (*Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringens*), устойчивых к другим химиотерапевтическим препаратам, включая антибиотики.

Этоний имеет бактериостатическое и бактерицидное действие, активный по отношению к стрептококкам, стафилококкам и другим микроорганизмам (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli* та другие). Имеет детоксицирующее действие на стафилококковые токсины. Действует местноанестезирующе, стимулирует заживление ран.

Витамин А — обеспечивает нормальный обмен веществ в организме, регулирует функции клеточных и субклеточных мембран, усиливает пластические процессы, влияет на рост и регенерацию эпителиальной ткани.

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактика и лечение у крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак мастита, эндометрита, проктита, заболеваний кожи (дерматит), слизистых оболочек, трещин сосков вымени, прямой кишки, ожогов, ран.

ДОЗИРОВКА

Внешне. На поврежденные места крем-эмульсию наносят тонким слоем 2-3 раза в сутки. Внутриматочно. С профилактической целью — эмульсию подогревают до 38-39°C и вводят с помощью шприца Жанэ коровам в день отела в дозе 100-200 мл. Через 24 часа введение препарата повторяют в той же дозе.

С лечебной целью — вводят по 100-200 мл эмульсии каждые 24 часов в течение 4-5 суток. Ректально. Для лечения проктитов эмульсию подогревают до 38-39°C и вводят с помощью канюли шприца собакам в дозе 3-5 мл. Лечебный курс — 5-7 суток. При необходимости курс лечения повторяют.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Применение молока в пищу людям разрешается через 5 дней после выздоровления, но не раньше чем через 4 суток после последнего внутрицистернального введения препарата. К указанному сроку молоко скармливают непродуктивным животным или утилизируют (в зависимости от заключения ветврача).

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги, стеклянные банки, пластиковые банки с пластиковыми крышками по 30, 50, 80, 100, 150, 250, 350, 500, 1000 г.

ХРАНЕНИЕ

Сухое, защищенное от света место при температуре от +8°C до +25°C

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

Купить → <http://vetlikar.com/shop/terapevticheskie-sredstva/krem-de-200g/>