

Мадуро Форте

Нерастворимый в воде порошок.

СОСТАВ

1 г препарата содержит действующие вещества:

- мадурамицин аммония — 9 мг;
- диклазурил — 2 мг;
- вспомогательные и формообразующие вещества — до 1 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мадурамицин – эймериостатик группы ионофоров, он действует на кокцидии (*E. tenella*, *E. acervulina*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetti*) в стадии спорозоитов, трофозоитов и шизонтов первой генерации. Механизм действия препарата основан на нарушении транспорта одновалентных ионов Na⁺ и K⁺ через мембрану клетки паразита с его дальнейшей гибелью.

Диклазурил – эймериостатик группы триазинов, нарушает энергетические обменные процессы эндогенного развития эймерий. Действует на все виды эймерий птиц (*Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. adenoeides*, *E. galloravonis*, *E. meleagrimitis* и др.), кролей (*E. flavescens*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedai* и др.), крупного рогатого скота, овец, коз и свиней.

ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение и профилактика кокцидиозов молодняка кур (цыплята-бройлеры, ремонтные цыплята яйценосных кроссов) до 16 недель; индюки до 12 недель, вызванных различными видами эймерий.

ДОЗИРОВАНИЕ

Препарат скармливают с кормом в концентрации 500 г препарата на 1 т корма (0,5 г препарата на 1 кг корма). Препарат тщательно перемешивают с кормом. Сначала с небольшой частью корма (3-10% общего количества), а затем полученную смесь перемешивают с остальным кормом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к мадурамицину и диклазурилу. Не применять курам-несушкам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять одновременно с другими противоккокцидийными препаратами. Запрещается применение Мадуро форте одновременно с тиамулином, а также в течение 7 дней до и 7 дней после применения тиамулина. Неравномерное смешивание препарата с кормом, неравномерное поедание корма, содержащего препарат (голодные, больные животные), превышение рекомендованных концентраций в корме могут, в отдельных случаях, приводить к снижению продуктивности животных и даже вызвать отравление.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ (КАРЕНЦИЯ)

Забой птицы на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Мешки по 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, темном, месте при температуре от 0 до 30 ° С, в заводской упаковке. Срок годности — 1 год.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/maduro-forfte/>