

# Мадуро

*Нерастворимый в воде порошок.*

## СОСТАВ

1 г препарата содержит действующее вещество:

- мадурамицин аммония — 10 мг;
- вспомогательные и формообразующие вещества — до 1 г.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мадурамицин – эймериостатик группы ионофоров, он действует на кокцидии (*E. tenella*, *E. acervulina*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. maxima*, *E. brunetti*) в стадии спорозоитов, трофозоитов и шизонтов первой генерации. Механизм действия препарата основан на нарушении транспорта одновалентных ионов Na<sup>+</sup> и K<sup>+</sup> через мембрану клетки паразита с его дальнейшей гибелью.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение и профилактика кокцидиозов молодняка кур (цыплята-бройлеры, ремонтные цыплята яйценосных кроссов) до 16 недель; индюков до 12 недель, вызванных различными видами эймерий.

## ДОЗИРОВАНИЕ

Препарат скармливают с кормом в концентрации 500 г препарата на 1 т корма (0,5 г препарата на 1 кг корма).

Препарат тщательно перемешивают с кормом. Сначала с небольшой частью корма (3-10% общего количества), а затем полученную смесь перемешивают с остальным кормом.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к мадурамицину. Не применять курам-несушкам.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять одновременно с другими противоккокцидийными препаратами. Запрещается применение Мадуро одновременно с тиамулином, а также в течение 7 дней до и 7 дней после применения тиамулина. Неравномерное смешивание препарата с кормом, неравномерное поедание корма, содержащего препарат (голодные, больные животные), превышение рекомендованных концентраций в корме могут, в отдельных случаях, приводить к снижению продуктивности животных и даже вызвать отравление.

## ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ (КАРЕНЦИЯ)

Забой птицы на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения препарата.

## ФОРМА ВЫПУСКА

Мешки по 25 кг.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, темном месте при температуре от 0 до 30 ° С, в заводской упаковке. Срок годности — 1 год.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/maduro/>