

# Метрициклин

*Метрициклин — для лечения коров, овец, коз при послеродовых внутриматочных инфекциях.*

## СОСТАВ

1 таблетка содержит действующее вещество : хлортетрациклина гидрохлорид — 100 мг .  
Вспомогательные вещества : микрокристаллическая целлюлоза, рисовый крахмал, кремния безводный коллоид, касторовое масло гидрогенизированное, стеарат магния.

## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФОРМА

Таблетки для внутриматочного введения.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Относится к группе антибактериальных и антисептических ветеринарных препаратов для применения в гинекологии.

Хлортетрациклин — антибиотик с выраженным бактериостатическим действием.

Механизм действия вещества связан с задержкой синтеза белка микробной клетки.

Хлортетрациклин блокирует прикрепление аминоацетильной тРНК к акцепторному месту , что тормозит присоединение новых аминокислот в цепи пептидов и, таким образом, ингибирует синтез белка.

Хлортетрациклин активен против грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, риккетсий, микоплазм, спирохет, хламидий. Особенно чувствительны по отношению к нему *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Brucella spp.*, *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Corynebacterium*, *Klebsiella spp.*

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для лечения коров, овец, коз при послеродовых внутриматочных инфекциях: острые и хронические эндометриты, метриты, задержка последа и для профилактики этих заболеваний после осложненных родов.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать животным с повышенной чувствительностью к хлортетрациклину.

## ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не установлено.

## ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Применять при достаточно открытой шейке матки (сразу после родов). Во время беременности не используют.

## ДОЗЫ И СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ

Препарат применяют внутриматочно в дозе :

Коровы, верблюды : профилактически 1 таблетка на одно животное однократно в течение 24 часов после родов. С лечебной целью: 1-2 таблетки на одно животное.

Овцы, козы: профилактически пол таблетки на одно животное однократно в течение 24 часов после окота. С лечебной целью : 1 таблетка на одно животное.

При необходимости лечение повторяют через 48 часов.

### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

Убой животных на мясо разрешается через 10 суток после последнего введения препарата. Потребление молока разрешается через 4 суток после последнего введения препарата. До указанного срока мясо и молоко скармливают непродуктивным животным или утилизируют (в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины).

### **ХРАНЕНИЕ**

В сухом прохладном защищенном от света месте при температуре от 15 ° С до 25 ° С.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года

### **УПАКОВКА**

картонная коробка с блистерами на 100 табл.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/protivomastitnye-i-protivoyendometri/metriciklin/>