

Настойка чемерицы

Настойка чемерицы — применяют для жвачных животных как руминаторное средство при болезнях преджелудков (атония, тимпания, переполнения рубца кормами и т. д.).

СОСТАВ

100 мл препарата содержит: протOVERATРИНА – 0,13 г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат в малых дозах раздражает слизистую желудка и рефлекторно усиливает моторику и секрецию желудка, а у собак и свиней вызывает рвоту.

Внешне действует инсектицидно, особенно на вшей, блох.

ПРИМЕНЕНИЯ

Внутренне — жвачным животным для восстановления жвачки при хронической тимпании, свиньям — как рвотное средство.

Наружно — для всех видов животных для уничтожения эктопаразитов (блох, вшей).

ДОЗИРОВКА

Внутренне в дозе 1-2 раза в день к полному выздоровлению (мл, на голову):

крупный рогатый скот — 5-12 (0,01-0,024 мл/кг массы тела);

овцы, козы — 2-4 (0,04-0,08 мл/кг массы тела);

свины — 1-2 (0,014-0,028 мл/кг массы тела).

При наружном применении настойку разводят водой 1:1. Применяют путем нанесения на пораженные участки кожи или на места сосредоточения эктопаразитов. Раствором препарата смачивают волосяной покров, мелких животных через 20-30 минут вычесывают и смывают водой. Повторно процедуру проводят через 10-14 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к препарату.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

С препаратом обращаться с осторожностью.

ХРАНЕНИЕ

В сухом, темном недоступном для детей месте при температуре от 2°C до 20°C в герметически закупоренной таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, ПЭТФ-тара темного цвета по 50 мл, 100 мл, 500 мл.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/terapevticheskie-sredstva/nastroyka-chemericy/>