

# Окси-кел 20

*Окси-кел 20 — окситетрациклин применяется в основном для лечения кишечных инфекций у свиней, КРС и МРС. Длительное действие (72 часа).*

## СОСТАВ

Окситетрациклина гидрохлорид экв. Окситетрациклина 200 мг Наполнитель до 1 мл.

## ПОКАЗАНИЯ

Инфекции, вызванные чувствительными возбудителями к окситетрациклину, такими как респираторные инфекции кишечного тракта, синдром мастит-метрит-агалактия (ММА) у свиноматок, копытная гниль у крупного рогатого скота, энзоотический аборт (Хламидиоз) у овец

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Чрезмерная чувствительность к тетрациклинам.  
Осложненная печеночная и / или почечная недостаточность.

## ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изредка окситетрациклиновая терапия может вызвать анафилактическую или другую аллергическую реакцию (лечение: антигистаминные и / или ГКС).  
Прием препарата может привести к чрезмерному росту инфертильных организмов, включая грибок.  
Может вызывать раздражение в месте инъекции.  
Слишком быстрая внутривенная инъекция может вызвать кардиоваскулярный коллапс.

## ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи.

## ПУТИ ВВЕДЕНИЯ И ДОЗЫ

Глубокая внутримышечная инъекция 20 мг окситетрациклина на 10 кг массы тела или 1 мл ОКСИ-кел 20 Л.А. на 10 кг массы тела. При необходимости лечение можно повторить с интервалом в 3 дня.

Избегать введения более 25 мл в одно место инъекции. Равномерно распределить общую дозу на 2 или больше мест инъекции.

ОКСИ-кел 20 Л.А. можно вводить путем медленной внутривенной инъекции, при которой достигается высокий уровень концентрации в крови.

## ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

в мясе: 21 день — в молоке: 6 дней

## ХРАНЕНИЕ

хранить в прохладном и защищенном от света месте.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Большие внутривенные дозы могут вызвать гепатотоксический и невротоксический эффекты, и кардиоваскулярные нарушения. Нежелательно применять беременным и молодым животным.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/oksi-kel-20/>