

PG 600

PG 600 — является зоотехническим средством для контроля фертильности и улучшения систем серийного производства. Он улучшает технические и экономические результаты (количество полученных поросят на свиноматку в год) и оптимизирует организацию и планирование работы.

СОСТАВ

Одна доза PG 600 содержит:

- Хорионический гонадотропин — 200 МО;
- Сывороточной гонадотропин жеребных кобыл (ГСЖК) — 400 МО.

1 мл растворителя содержит:

- Натрия гидрогенофосфат — 0,63 мг;
- Дигидрогенофосфат натрия — 0,66 мг;
- Вода для инъекций — 998,71 мг.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФОРМА

Порошок белого цвета, который растворяется в специальном прилагаемом растворителе.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакологическое действие определяется наличием в препарате гонадотропина сыворотки крови жеребых кобыл (ГСЖК), который по свойствам близок фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ), и наличием в препарате хорионического гонадотропина (ХГ) подобного по свойствам к ЛГ.

ВИД ЖИВОТНЫХ

Свины

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Животные Свиноматки	Показания восстановления полового цикла	Срок действия 0-2 дня после отъема поросят
	увеличение количества поросят в помете	0-2 дня после отъема поросят
	отсутствие половой охоты	примерно на 10-й день после отъема поросят
	контроль супоросности	в течение 80 дней после оплодотворения, или искусственного размещения
	отсутствие половой охоты	в возрасте 8-10 месяцев
Ремонтные свинки	индукция половой охоты	животные в возрасте от 5,5-6,5 месяцев и массой от 85 до 100 кг могут быть оплодотворены в первую течку после введения. Если оплодотворение провести во вторую течку, то возрастает вероятность большого приплода
	диагностика супоросности	в течение 80 дней после оплодотворения, или искусственного размещения

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отсутствуют

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не установлены

ОСОБЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Отсутствуют

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Для диагностики беременности

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

Возможно использование с другими средствами, влияющими на репродукцию

ДОЗЫ И СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫМ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

PG 600 вводятся в дозе 5 мл (400 МО ГСЖК и 200 МО ХГ) на 1 свиноматку, однократно, внутримышечно в область за ухом.

ПЕРЕДОЗИРОВКА (СИМПТОМЫ, НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ, АНТИДОТЫ)

Передозировка отсутствуют. При анафилактической реакции применить ГКС или адреналин

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять животным с повышенной чувствительностью к ГСЖК

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ (КАРЕНЦИИ)

Отсутствует

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Отсутствуют

ФОРМЫ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

Не установлены

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности 3 года, после вскрытия ампулы использовать в течение 24 часов

Купить → <http://vetlikar.com/shop/gormonalnye-preparaty/pg-600/>