

# Рафензол

*Рафензол — для дегельминтизации крупного рогатого скота, овец и коз против трематодозов (параμφистоматидозы, дикроцелиоз, фасциолез) и нематодозов пищевого тракта и легких.*

## СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующие вещества:

- рафоксанид — 110 мг,
- фенбендазол — 75 мг

Вспомогательные вещества: тилоза, твин-80, вода апиrogenная (до 1 мл).

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Антигельминтный препарат широкого спектра действия, в состав которого входят действующие вещества рафоксанид и фенбендазол. Механизм действия рафоксанида связан с нарушением энергетического обмена гельминтов и со способностью разъединять окислительное фосфорилирование. Фенбендазол ингибирует ферментную систему гельминтов, что также приводит к нарушению энергетического обмена и вызывает гибель паразитов.

Рафензол эффективен против половозрелых трематод семейства Paramphistomatidae, и их личинок (от 6-недель). Наряду с параμφистоматидами, препарат пагубно действует на половозрелые трематоды вида *Fasciola hepatica* и *Dicrocoelium lanceatum*; желудочно-кишечные и легочные нематоды: *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Dictyocaulidae* spp., *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Ostertagia* spp., *Strongyloides* spp., *Trichostrongylus* spp., *Trichuris* spp. и т.п.; на некоторые виды цестод (*Avitellina centripunctata*, *Moniezia expansa*, *M. benedebia*, *Thysaniezia giardi*) и личинок *Oestrus ovis*.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Дегельминтизация крупного рогатого скота, овец и коз при трематодозах (параμφистоматидозы, дикроцелиоз, фасциолез) и нематодозах кишечного тракта и легких.

## ДОЗИРОВАНИЕ

Дегельминтизацию проводят однократно до начала утренней кормежки. Препарат вводят внутрь с теплой водой (25-30 °C) с помощью бутылки или в смеси с 1,5-2 кг увлажненного комбикорма в следующих дозах:

### Крупный рогатый скот:

- дикроцелиоз, фасциолез — 0,75 мл/10 кг массы тела,
- параμφистоматидозы — 1 мл/10 кг массы тела.

### Овцы, козы:

- ассоциированные гельминтозы и эстроз — 0,75 мл/10 кг массы тела.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не назначать глубокотельным коровам и коровам, которые недавно растелились.

Не назначать животным с клиническими признаками расстройства органов пищеварения (атония преджелудочков, тимпания).

Не применять одновременно с бромсаланфлукицидами.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Перед массовой дегельминтизацией каждую серию Рафензола предварительно испытывают на нескольких животных, за которыми наблюдают в течение суток.

Убой животных на мясо разрешается через 28 суток, а употребление молока в пищу людям через 7 суток после применения препарата.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Флаконы из оранжевого стекла или полимерных материалов по 50, 100, 500 и 1000 мл.

## **ХРАНЕНИЕ**

Флаконы из оранжевого стекла или полимерных материалов по 50, 100, 500 и 1000 мл.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/rafenzol/>