

Раствор Броваглюкин

Раствор Броваглюкин — применяют при до- и послеродовых залеживаниях, задержке последа, родильном парезе, гипокальциемии, рахите, остеомаляции, тетании, аллергических состояниях, кровотечениях, токсикозах, кетозах и других нарушениях обмена веществ.

ОПИСАНИЕ

Прозрачный, стерильный раствор со слабым бледно-желтым оттенком.

СОСТАВ

100 мл препарата содержат, г:

- кальция глюконат – 28,0;
- магния гипофосфит – 5,3;
- холина хлорид – 0,4;
- вспомогательные вещества и вода для инъекций до 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Составляющие компоненты броваглюкина, находясь в оптимальном соотношении, нормализуют состояние животного при нарушениях обмена кальция, фосфора и магния в организме. При этом ионы кальция ускоряют свертываемость крови и повышают плотность кровеносных сосудов, предотвращают развитие отеков, обеспечивают противовоспалительное действие и снижают аллергическую реакцию организма. Фосфор оказывает общее стимулирующее действие и активизирует ферментативные процессы. Магний обеспечивает метаболизм белков и углеводов и повышает реактивность нервно-мышечного аппарата. Холина хлорид играет важную роль в обмене фосфолипидов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат применяют при до- и послеродовых залеживаниях, задержке последа, родильном парезе, гипокальциемии, рахите, остеомаляции, тетании, аллергических состояниях, кровотечениях, токсикозах, кетозах и других нарушениях обмена веществ. **ДОЗИРОВАНИЕ.** Броваглюкин вводят внутримышечно. Крупным животным возможно внутривенное введение. При этом дозу броваглюкина смешивают с равной частью 40% раствора глюкозы, подогревают до температуры тела и медленно вводят.

Дозы (на 10 кг массы тела):

- крупному рогатому скоту – 5-10 мл;
- лошадям – 3-7 мл;
- мелкому рогатому скоту, свиньям – 3-5 мл;
- собакам, котам – 3 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не известны.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

При внутривенном введении Броваглюкина в редких случаях возможно беспокойство животных с судорожными сокращениями мышц, которые исчезают после отмены введения.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные ампулы по 10 мл, стеклянные флаконы по 100, 200 мл.

ХРАНЕНИЕ

Сухое, темное место при температуре от 4 °С до 25 °С

СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

Срок годности (после первого вскрытия): при соблюдении правил асептики хранить при температуре от 4 °С до 6 °С в течение 48 часов.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/terapevticheskie-sredstva/rastvor-brovaglyukin/>