

Раствор новокаина 2%

Раствор новокаина 2% — применяют как местноанестезирующее средство для проводниковой анестезии в хирургии, для снятия спазмов кишечника, путем блокад, как препарат патогенетической терапии целого ряда заболеваний.

ОПИСАНИЕ

Стерильный, прозрачный раствор без цвета.

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество (мг):

- новокаин (прокаина гидрохлорид) – 20,0.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2%-й раствор новокаина вызывает местную анестезию, умеренно снижает возбудимость коры головного мозга, тем самым перестраивая вегетативную иннервацию.

Терапевтическое действие препарата начинается через 15-25 минут и длится более 48 часов с момента введения. Через интерорецепторы новокаин влияет на обмен веществ в организме, снижает возбудимость центральной нервной системы, улучшает синтез фолиевой кислоты. Одновременно повышается фагоцитарная способность клеток, возрастает содержание тканевых ферментов, что снижает интенсивность течения воспалительных процессов и ускоряет выздоровление животных.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяют как местноанестезирующее средство для проводниковой анестезии в хирургии; для снятия спазмов кишечника; путем блокад, как препарат патогенетической терапии целого ряда заболеваний.

ДОЗИРОВАНИЕ

Препарат вводят внутримышечно и внутривенно. Дозы и способы введения препарата зависят от цели введения (инфильтрация раствора в ткани в месте прохождения нерва, эпидуральное введение).

Максимальные разовые дозы (мл на 1 животное):

Перед использованием раствор новокаина следует подогреть до температуры тела животного. Внутривенно препарат вводить медленно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к новокаину.

Препарат несовместим с танидами, щелочами, окислителями, солями тяжелых металлов, гексаметилентетрамин (уротропином), сульфаниламидами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не превышать максимальных доз! Внутривенное введение препарата в максимальных дозах вызывает возбуждение.

ХРАНЕНИЕ

Сухое, темное место при температуре от 4 °С до 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные ампулы по 5, 10, 20 мл или стеклянные флаконы с резиновой пробкой под алюминиевую обкатку, по 50, 100 и 200 мл.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/terapevticheskie-sredstva/rastvor-novokaina-2/>