

Ротавек Корона

Ротавек Корона — вакцина для профилактики рота вирусной, корона вирусной инфекций и эшерихиоза молодняка крупного рогатого скота.

СОСТАВ

Одна доза вакцины содержит:

Активнодействующие компоненты:

- инактивированный ротавирус; —
- инактивированный коронавирус;
- адгезивный антиген.

Вспомогательные вещества:

- адъювант Монтанид ISA 70;
- алюминия гидроксид;
- натрия сульфат;
- стерильный физиологический раствор — до 2 мл.

Инактивованты:

- формальдегид;
- тиомерсал.

Вакцина может содержать остатки полимиксина В и неомицина.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФОРМА

Эмульсия

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцина обеспечивает передачу телятам колострального иммунитета от иммунизированных коров против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза. Продолжительность иммунитета зависит от своевременности выпойки молозива и его качества.

ВИД ЖИВОТНЫХ

Крупный рогатый скот

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяют тельным коровам за 3-12 недель до запланированной даты отела с целью дальнейшей передачи колострального иммунитета против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нет. Вакцинировать только клинически здоровых коров.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Первые порции молозива после отела выпаивают новорожденным телятам не позднее 6 часов после рождения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

Не смешивать с другими вакцинами и препаратами.

Не применять другие вакцины в течение 14 суток до и 14 суток после введения Ротавек Корона

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Вакцину применяют тельным коровам.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перед применением флаконы с вакциной тщательно встряхивают. Вакцину вводят внутримышечно в среднюю область шеи в дозе 2 мл с соблюдением правил асептики. Для вакцинации используют шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 15-20 мин. Допускается использование одноразовых шприцов.

Первые порции молозива после отела выпаивают новорожденным телятам не позднее 6 часов после рождения.

Далее молозиво и молоко от вакцинированных коров, полученное в первые 6-8 выдаиваний после отела, рекомендуется собирать и хранить в охлажденном (при температуре 2-8 °С) или в замороженном состоянии. Подогрев или размораживание молозива осуществляют при температуре не выше 42°С. Сборное молоко и молозиво от вакцинированных новотельных коров (6-8 выдаиваний) рекомендуется добавлять каждому теленку по 2,5-3,5 л/сутки в течение первых двух недель жизни.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

У отдельных коров возможно возникновение незначительного отека в месте инъекции, что приходит самостоятельно в течение 14-21 суток.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ (КАРЕНЦИИ)

Ноль дней

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Необходимо придерживаться правил работы с ветеринарными препаратами.

При попадании вакцины в глаза, промыть большим количеством теплой воды.
При попадании вакцины на кожу — промыть большим количеством теплой воды с мылом.

Использовать индивидуальные средства защиты. При случайном введении препарата человеку, обратиться к врачу, показав упаковку или инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, темном месте при температуре от 2-8°С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для посторонних лиц, особенно детей, месте.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

После вскрытия флакона, содержимое использовать в течение 3-х часов

Купить → <http://vetlikar.com/shop/vakciny-dlya-krs/rotavek-korona/>