

# Салимикс Плюс

Порошок для орального применения

## СОСТАВ

1 г препарата содержит действующие вещества:

салиномицин натрия — 110 мг;

диклазурил — 2 мг;

вспомогательные и формообразующие вещества — до 1 г.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Салиномицин – эймериостатик группы ионофоров, он действует на кокцидии (*E. acervulina*, *E. tenella*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. mivati*, *E. meleagridis*, *E. meleagrimitis*, *E. bovis*) в стадии спорозоитов, трофозоитов и шизонтов первой генерации. Механизм действия препарата основан на нарушении транспорта одновалентных ионов Na<sup>+</sup> и K<sup>+</sup> через мембрану клетки паразита с его дальнейшей гибелью. Он также активен относительно грампозитивных микроорганизмов и анаэробов *Serpulina* (*Treponema*) *hyodysenteriae*. Салиномицин повышает прирост и эффективность конверсии корма у свиней и жвачных животных.

Диклазурил – эймериостатик группы триазинов, нарушает энергетические обменные процессы эндогенного развития эймерий. Действует на все виды эймерий птиц (*Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. adenoides*, *E. gallopavonis*, *E. meleagrimitis* и др.), кролей (*E. flavescens*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedai* и др.), крупного рогатого скота, овец, коз и свиней.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение и профилактика кокцидиозов молодняка кур (цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк) до 12 недель; молодняка крупного рогатого скота и овец (телята и ягнята с развитыми преджелудками), свиней, вызванных различными видами эймерий.

## ДОЗИРОВАНИЕ

Препарат скармливают животным с кормом в следующих концентрациях:

Птица — 500 г препарата на 1 т корма (0,5 г препарата на 1 кг корма);

Свиньи до 4 месячного возраста – 250-500 г препарата на 1 т корма;

Свиньи от 4 до 6 месячного возраста – 250 г препарата на 1 т корма;

Телята, ягнята — 84 – 250 г препарата на 1 т корма.

Препарат тщательно перемешивают с кормом. Сначала с небольшой частью корма (3-10% общего количества), а затем полученную смесь перемешивают с остальным кормом.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к салиномицину и диклазурилу. Не применять курам-несушкам, а также телятам и ягнятам с неразвитыми преджелудками

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

Не применять одновременно с другими противоккокцидийными препаратами. Запрещается применение Салимикс плюс одновременно с тиамулином, а также в течение 7 дней до и 7 дней после применения тиамулина. Не использовать для лошадей. Неравномерное смешивания препарата с кормом, неравномерное поедания корма, содержащий препарат (голодные, больные животные), превышение рекомендованных концентраций в корме могут, в отдельных случаях, приводить к снижению продуктивности животных и даже вызвать отравление.

## **ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ**

Забой птицы на мясо разрешается через 5 суток после последнего применения препарата, свиней, телят, ягнят — без ограничений.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Мешки по 25 кг.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в сухом, темном месте при температуре от 0 до 30 ° С, в заводской упаковке. Срок годности — 1 год.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/salimix-plus/>