

# Спелимикс 100

- Спелимикс® 100 является антимикробным препаратом широкого спектра действия
- Эффективен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
- Особенно эффективен при заболеваниях респираторного тракта, в том числе при микоплазмозах
- Препарат выбора при дизентерии и кампилобактериозе свиней

## СОСТАВ

Каждая упаковка (150 г) содержит действующие вещества:

- линкомицина гидрохлорид — 33,3 г;
- спектиномицина сульфат — 66,7 г;
- Вспомогательные вещества — до 150 г.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Линкомицин и спектиномицин в комбинации эффективны против грамположительных микроорганизмов (*Actinomyces* spp., *Corynebacterium* spp., *Clostridium* spp., *Erysipelotrix rhusiopathie*, *Staphilococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pasteurella multocida*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Actinobacillus* spp., *Bordetella* spp., *E. coli*, *Haemophilus* spp., *Salmonella* spp.), а также против *Lawsonia* spp., *Brachyspira* (*Serpulina*) *hyodysenteriae*, *Vibrio coli* и микоплазм. Спелимикс® 100 не оказывает токсичного влияния на организм животных, не вызывает отрицательных последствий даже при превышении рекомендованных доз в несколько раз. Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действиями.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для профилактики и лечения инфекций органов пищеварения и легких, вызванных микроорганизмами, чувствительными к линкомицину и спектиномицину у свиней (например, колибактериоз, сальмонеллез, дизентерия, микоплазмоз), домашней птицы (например, некротический энтерит, микоплазмоз), для повышения сохранности поголовья и увеличения эффективности кормления.

## ДОЗИРОВАНИЕ

Препарат Спелимикс 100 задают с питьевой водой в следующих дозах:

Поросята — 1,5 г препарата на 100 кг массы тела или 150 г препарата на 1500 л питьевой воды. Длительность лечения 4-7 дней.

Птица — 150 г препарата на 150 — 200 л питьевой воды на протяжении 5 — 7 дней.

Вода с препаратом должна быть единственным источником воды на протяжении всего курса лечения.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не применять птице, яйца которой предназначены в пищу людям.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Препарат Спелимикс 100 можно задавать только поросётам и птице. Растворенный препарат необходимо использовать на протяжении 24 часов. Нельзя применять Спелимикс® 100 вместе с эритромицином.

## **ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ (КАРЕНЦИИ)**

Свины – 3 суток, птица – 2 суток.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Пакеты из пленочных или фольгированных материалов по 150 г.

## **ХРАНЕНИЕ**

Препарат хранят в транспортной таре, в крытых складских помещениях, в темном, сухом месте при температуре от 0 до + 25°C. Срок годности — 2 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/spelimix-100/>