

Тилмовет

Раствор для орального применения

- Противомикробное средство системного действия, имеющее в своем составе тилмикозин
- Применяют для лечения и профилактики инфекционных заболеваний дыхательных путей птицы, обусловленных микоплазмой, орнитобактериями, пастереллой и другими микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество:

- тилмикозин — 250 мг;
- Вспомогательные вещества — до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Действующее вещество препарата Тилмовет – тилмикозин, – полусинтетический антибиотик группы макролидных антибиотиков с широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а особенно против *Pasteurella* spp., *Haemophilus*, *Actinomyces*, *Corynebacterium* и *Mycoplasma* spp.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат Тилмовет применяют для лечения и профилактики инфекционных заболеваний дыхательных путей птицы, обусловленных микоплазмой (*Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*), орнитобактериями, пастереллой (*Pasteurella multocida*) и другими микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину. Свины: лечение респираторных заболеваний, вызванных чувствительной микрофлорой (*Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, др.). Телята: лечение респираторных заболеваний вызванных *Mycoplasma bovis*, *M. dispar*, *Pasteurella multocida*, *P. haemolytica* и другими чувствительными к тилмикозину микроорганизмами.

ДОЗИРОВАНИЕ

Препарат применяют с питьевой водой в следующих дозах:

Птица: 30 мл препарата на 100 литров питьевой воды на протяжении первых 3 дней жизни, повторить в такой же дозе на 21 день жизни.

Свины: 80 мл препарата на 100 л питьевой воды или 15-20 мг тилмикозина на 1 кг массы тела на протяжении 5 суток.

Телята: 1 мл препарата на 20 кг массы тела дважды в день в течение 3-5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат не применяют животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Не применяют курам-несушкам, яйца которых идут в пищу людей.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Побочных явлений и осложнений при применении Тилмовета в рекомендованных дозах не наблюдается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Препарат не назначают в субтерапевтических дозах и животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

7 дней.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор в полиэтиленовых флаконах по 300 мл.

ХРАНЕНИЕ

В заводской упаковке, в сухом, темном месте при температуре от +15 до +30°C. Срок годности – 2 года. Срок годности после растворения – 24 часа.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/tilmovet-oral/>