

Толикоккс

Раствор для орального применения

- Содержит действующее вещество толтразурил
- Применяется для лечения и профилактики кокцидиоза у птицы
- Эффективен против всех видов кокцидий и всех резистентных штаммов
- Хорошо переносится даже после 10-кратного превышения дозы, совместим с кормовыми добавками, витаминами и лекарственными препаратами для птицы

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующее вещество:

толтразурил — 25 мг;
вспомогательные вещества — до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Толтразурил (действующее вещество препарата Толикоккс) – это синтетическое вещество, которое относится к группе триазинтриона с высокой степенью безопасности. В отличие от других кокцидиостатиков толтразурил имеет кокцидиоцидное действие на все внутриклеточные стадии развития кокцидий. Эффективен против всех видов кокцидий. Толикоккс не нарушает образование иммунитета против кокцидиоза, хорошо переносится даже после 10-кратного превышения дозы, совместим с кормовыми добавками, витаминами и лекарственными препаратами для птицы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Препарат Толикоккс применяют для лечения и профилактики кокцидиоза:

- бройлеры и ремонтный молодняк кур – *E.acervulina*, *E.brunetti*, *E.tenella*, *E.maxima*, *E.necatrix*, *E.mitis*;
- индюки – *E.adenoides*, *E.meleagrimitis*;
- гуси и утки – *E.anseris*, *E.truncata*.

ДОЗИРОВАНИЕ

Толикоккс применяют птице при достижении критического уровня кокцидий в подстилке (свыше 10 тыс. ооцист/1гр.) или при появлении клинических признаков заболевания. Препарат применяют с питьевой водой в дозах 25 мг (1 мл / 1 л питьевой воды) на протяжении периода лечения (48 часов) или 75 мг (3 мл/1 л питьевой воды) на протяжении 8 часов в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять курам-несушкам.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При применении препарата в рекомендованных дозах побочное действие не наблюдается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Препарат не назначают в субтерапевтических дозах и животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ (КАРЕНЦИИ)

Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор в полиэтиленовых флаконах по 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ

В заводской упаковке, в сухом, темном месте при температуре от +5 до +30°C. Срок годности – 2 года. Срок годности после растворения – 24 часа.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/tolikoks/>