

Трематозол

Трематозол — применяют крупному рогатому скоту, овцам и козам при гельминтозах, вызванных видами трематод и нематод, чувствительными к компонентам препарата.

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующие вещества:

- оксиклозанид — 95 мг,
- пирантела памоат — 200 мг;
- вспомогательные вещества — до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинация двух действующих веществ, оксиклозанида и пирантела памоата, обеспечивает универсальный широкий спектр антигельминтного действия в отношении ключевых хозяйственно-значимых возбудителей трематодозов и нематодозов, паразитирующих у крупного рогатого скота, овец и коз.

Оксиклозанид — синтетическое соединение из группы салициланилида. Его специфическое действие обуславливает торможение и остановку процесса окислительного фосфолирования в организме трематод, что изменяет энергетический метаболизм паразитов и вызывает их гибель.

Пирантела памоат — синтетическое соединение из группы пиримидинов. Его специфическое действие вызывает у нематод деполаризованную нервно-мышечную блокаду, вследствие паралича мышц, гельминты выводятся из кишечника перистальтикой. Пирантела памоат эффективен преимущественно в отношении личинок и половозрелых нематод, паразитирующих в пищеварительном тракте (*Neoascaris vitulorum*, *Bunostomum trigonocephalum*, *Trichostrongylus columbriformis*, *T. axei*, *Trichuris skrjabini*, *T. ovis*, *Chabertia ovina* и т.п.).

ПРИМЕНЕНИЕ

Лечение и профилактика крупного рогатого скота, овец и коз при гельминтозах, вызванных видами трематод и нематод чувствительных к компонентам препарата Трематозол.

ДОЗИРОВАНИЕ

Крупный рогатый скот — 1 мл на 10 кг массы тела, однократно с питьевой водой;

Овцы и козы — 0,75 мл на 10 кг массы тела, однократно.

Профилактически-лечебная дегельминтизация проводится в начале стойлового периода.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не назначать истощенным животным.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

После последнего применения препарата убой животных на мясо разрешается через 14 суток, молоко можно употреблять в пищу через 3 суток.

Тщательно проверять точность дозировки при групповой дегельминтизации.

Нельзя применять препарат овцематкам в период спаривания, а также в период первого месяца после удаления баранов из стада. Также не рекомендуется применять коровам в первый месяц после осеменения.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные и пластиковые флаконы по 50, 120 и по 1000 мл.

ХРАНЕНИЕ

В сухом, темном месте при температуре от 0 до 30 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/trematozol/>