

# Трифлон 100

Раствор для инъекций

- Инъекционный противомикробный препарат системного действия, имеющий в своем составе энрофлоксацин и триметоприм
- Безболезненное место укола в отличие от других инъекционных препаратов
- Максимальная эффективность и сила действия препарата
- Широкий спектр действия

## СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующие вещества:

- энрофлоксацин — 100 мг;
- триметоприм — 50 мг;
- вспомогательные вещества — до 1 мл.

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин – противомикробное средство широкого спектра действия из группы фторхинолонов. Препарат обладает противомикробным действием против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Listeria monocytogenes*, *Corinebacterium* spp., *Pseudomonas* spp., *E. coli*, *Haemophilus* spp., *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Pasteurella* spp. и др.), а также действует на микоплазмы (*Mycoplasma* spp.) и хламидии (*Chlamidia* spp.). Механизм действия связан с угнетением бактериальной ДНК-гиразы, что приводит к нарушению репликации ДНК бактерий.

Триметоприм – противомикробное средство широкого спектра действия из группы диаминопиримидинов. Препарат обладает противомикробным действием против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (*Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp.; *Pasteurella* spp.; *Enterobacter* spp., *Proteus* spp.; *Shigella* spp.; *Staphylococcus* spp.; *Streptococcus* spp.; *Haemophilus* spp.; *Chlamidia* spp.), а также действует на токсоплазмы и кокцидии. Механизм действия связан с угнетением бактериальной редуктазы дигидрофолиевой кислоты.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Лечения крупного рогатого скота и свиней, больных инфекционными заболеваниями, вызванных микроорганизмами, чувствительными к энрофлоксацину и триметоприму.

## ДОЗИРОВКА

**Крупный рогатый скот** – 2,5 мл на 100 кг массы тела подкожно 1 раз в сутки в течение 3-5 суток. При сальмонеллезе и инфекциях органов дыхания — 5 мл на 100 кг массы тела подкожно 1 раз в сутки в течение 5 суток.

**Свиньи** – 0,25 мл на 10 кг массы тела внутримышечно 1 раз в сутки в течение 3 суток. При сальмонеллезе и инфекциях органов дыхания — 0,5 мл на 10 кг массы тела внутримышечно 1 раз в сутки в течение 5 суток.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность к энрофлоксацину и триметоприму. Запрещается применение препарата свиньям в период беременности.

## **ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ (КАРЕНЦИИ)**

Забой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения препарата. Потребление молока в пищу людям разрешается через 7 суток после последнего применения препарата. Полученное, до указанного срока, мясо и молоко утилизируют или скармливают непродуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Стеклянные флаконы по 100 мл.

## **ХРАНЕНИЕ**

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 ° до 25 ° С. Срок годности — 3 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/triflon-100/>