

Унисан

- Применяется при всех заболеваниях кожи, где участвует бактериальная и грибковая микрофлора (стафилококкоз, все виды пиодермии, импетигиозная экзема, кандидоз, трихофития, микроспория, себорея, наружный отит, гнойные раны и поверхностные абсцессы, ожоги)
- Обладает выраженным антисептическим противовоспалительным, вяжущим и местным анальгезирующим действием
- Вследствие выраженной гипертоничности усиливает экссудацию, ускоряет течение гнойных процессов, способствует очищению и заживлению гнойных ран
- Глубоко проникает в толщу кожи

СОСТАВ

1 г препарата содержит:

- 10 мг хлоргексидина биглюконата,
- вспомогательных и формообразующих веществ до 1 грамма.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Обладает выраженным антисептическим действием. Ее компоненты эффективны в отношении вегетативных форм грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дрожжей, дерматофитов, липофильных вирусов, хламидий. Кроме того, препарат обладает противовоспалительным, вяжущим, местным анальгезирующим действиями. Вследствие своей гипертоничности, мазь «Унисан» усиливает экссудацию, ускоряет течение гнойных воспалительных процессов, оказывает содействие очищению и заживлению инфицированных ран. Микроэлемент цинк, входящий в состав мази, незаменим для нормального функционирования кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мазь «Унисан» применяется при всех заболеваниях кожи, где предполагается участие бактериальной и грибковой микрофлоры:

- Стафилококкоз кожи
- Пиодермии (все виды)
- Импетигиозная экзема
- Кандидоз кожи (молочница)
- Дерматомикозы (трихофития, микроспория)
- Себорея
- Наружный отит
- Гнойные раны и поверхностные абсцессы
- Ожоги

Применяется для всех видов животных.

Препарат наносят на поврежденные участки кожи тонким слоем 1-2 раза в день. Продолжительность применения определяется видом патологического процесса. В любом случае необходимо применять мазь, по крайней мере, на протяжении 2-3 дней после исчезновения клинических признаков заболевания. При грибковых заболеваниях препарат наносят на протяжении 7-10 дней после исчезновения клинических признаков заболевания.

При гнойных ранах и абсцессах пропитывают мазью марлевые салфетки, которыми заполняют рану или полость абсцесса. перевязки проводят каждый день до полного

очищения от гнойно-некротических масс. В глубокие пустоты мазь вводят в подогретом виде с помощью шприца (без иглы).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

Следует избегать попадания мази на слизистую оболочку глаз.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нежелательно одновременное применение препаратов йода во избежание развития дерматитов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные или стеклянные банки, флаконы, а также алюминиевые тубы по 15 г, 200 г.

ХРАНЕНИЕ

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок хранения – 2 года.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/terapevticheskie-sredstva/unisan/>