

Эктосан спот-он

Эктосан спот-он — применяют для профилактики и лечения лошадей, верблюдов, собак при поражении эктопаразитами: летающими кровососущими насекомыми, блохами, мухами; иксодовыми клещами и возбудителями других эктопаразитозов. (комментарии и отзывы о ветеринарном препарате).

СОСТАВ

1 мл препарата содержит действующие вещества (мг):

- альфациперметрин — 65;
- пиперонил-бутоксид — 30,0;

Вспомогательные вещества: гераниол, диметилформамид, этанол.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

В основе комплексного механизма действия двух экицидов (альфациперметрин, пиперонил-бутоксид) является блокировка ионных каналов нервных клеток паразитов. Нарушение транспорта ионов калия и натрия в мембранах нейронов влечет деполяризацию и повышенное расслабление нейротрансмиттеров и проявление нервно-мышечного блокирования эктопаразитов. Препарат в рекомендованных дозах обеспечивает защиту от летающих насекомых и клещей в течение 28 суток, а от блошиной инвазии — до 90 суток.

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактика и лечение лошадей, верблюдов, собак при поражении эктопаразитами:

летающими кровососущими насекомыми (слепнями, комарами, мошками и другим гнусом), блохами, мухами;

иксодовыми клещами и возбудителями других эктопаразитозов, чувствительных к действующим составляющим препарата Эктосан-спот-он.

ДОЗИРОВАНИЕ

Лошадям и верблюдам препарат применяют в дозе 33 мл на животное. Молодняку этого вида животных массой тела до 200 кг, препарат применяют из расчета 1,5 мл/10 кг массы тела.

Раствор (по 2-3 мл в одно место) наносят на кожу в области шеи, холки, подгрудка, бедер и вокруг хвоста.

Собакам препарат применяют в следующих дозах:

массой тела до 15 кг — 1,5 мл препарата наносят на кожу в области между лопатками;

массой тела от 15 до 30 кг — 3 мл препарата наносят на кожу в области между лопатками и возле корня хвоста;

массой тела более 30 кг — 4,5 мл препарата наносят на кожу в области между лопатками, на спине вдоль позвоночника (точечно) и возле корня хвоста.

Обработку рекомендуется проводить в вечернее время, чтобы в следующие 10-15 часов исключить возможность пребывания животных под действием прямых солнечных лучей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не обрабатывать клинически больных и истощенных животных.

Не назначать жеребяткам и щенкам в возрасте до 3-х месяцев.

Не назначать подсосным кобылам в течение первых двух месяцев после родов.

Не назначать животным других видов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

При обработке животных избегать попадания препарата на поврежденную кожу животных, в глаза и на слизистые оболочки.

После обработки животных рекомендуется ограничить манипуляции с ними и предотвращать в течение суток попадания на обработанные участки кожи воды и моющих средств. Если это не удалось, следует провести повторную обработку, но не ранее, чем через 7 суток.

Работы с препаратом необходимо проводить с использованием перчаток. Во время работы запрещается курить. После окончания работы следует тщательно вымыть руки с мылом.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные или полипропиленовые ампулы, или флаконы по 1,5; 3; 4,5 мл и флаконы по 33 или 330 мл.

ХРАНЕНИЕ

Хранят препарат в таре производителя в защищенном от света месте при температуре до 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/yektosan-spot-on/>