

Энрофлокс 10%

Энрофлокс 10% — антибактериальный препарат для лечения сельскохозяйственной птицы при заболеваниях бактериальной этиологии и микоплазменных инфекций, вызванных микроорганизмами, проявляющих чувствительность к фторхинолонам.

СОСТАВ

Энрофлоксацин — 100 мг/мл.

СВОЙСТВА

Энрофлоксацин, входящий в состав Энрофлокса 10%, относится к группе фторхинолонов и обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella*, *Pasteurella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Bordetella*, *Campylobacter spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Actinobacillus*, *Clostridium spp.*, *Proteus spp.* и *Mycoplasma spp.*. Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки. При пероральном введении энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается и быстро проникает в органы и ткани организма. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через 0,5 — 1 час после введения и удерживается на терапевтическом уровне в течение 24 часов. Выводится энрофлоксацин из организма преимущественно в неизменном виде, частично метаболизируется в ципрофлоксацин и выделяется с мочой.

ПОКАЗАНИЯ

Энрофлокс 10% применяют для лечения колибактериозов, сальмонеллезов, некротического энтерита, стрептококкоза, микоплазмозов и других заболеваний, вызванных микроорганизмами, чувствительными к фторхинолонам у бройлеров и ремонтного молодняка птиц.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Энрофлокс 10% применяют перорально с водой для поения в дозе 0,5 мл на 1 л воды в течение 3 дней, а при сальмонеллезе — в течение 5 дней. Раствор готовят из расчета суточной потребности птицы в воде. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую Энрофлокс 10%.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не допускается применение Энрофлокса 10% курам-несушкам в связи с накоплением энрофлоксацина в яйцах.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении Энрофлокса 10% в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение Энрофлокса 10% одновременно с левомицетином, теофилином и стероидами. Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 11 суток после последнего применения препарата.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 3 года со дня производства. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Флаконы 1 л.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antibakterialnye-preparaty/lenrofloks-10/>