

Эспакоккс 5%

Эспакоккс 5% — противококцидийный препарат в форме суспензии для перорального применения для лечения и профилактики кокцидиоза у поросят и молодняка крупного рогатого скота.

СОСТАВ

Толтразурил — 50 мг/мл

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эспакоккс 5 % относится к антикокцидийным лекарственным препаратам группы триазинтриона. Толтразурил, входящий в состав препарата, обладает широким спектром кокцидиоцидного действия на стадиях внутриклеточного развития паразитов, эффективен в отношении *Isospora suis*, *Eimeria arloingi*, *Eimeria scabra*, *Eimeria guevarai*, *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii*, *Eimeria alabamensis* и других видов кокцидий, паразитирующих у свиней и крупного рогатого скота. Блокируя дыхательные ферменты, толтразурил оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов. После перорального введения Эспакоккса 5% толтразурил медленно всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистой оболочках. В организме метаболизируется путем сульфоокисления и гидроксирования, с образованием производных сульфоксида и сульфона. Выводится толтразурил из организма в основном в неизмененном виде (70%), а также в виде метаболитов с пометом.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Эспакоккс 5% применяют животным перорально индивидуально однократно при помощи дозатора в следующих дозах:

- **поросятам** на 3-5 день жизни в дозе 20 мг толтразурила на 1 кг массы животного, из расчета 0,4 мл суспензии на 1 кг массы, но не менее 0,5 мл на животное;
- **телятам** с 2-недельного возраста в дозе 15 мг толтразурила на 1 кг массы животного, из расчета 0,3 мл суспензии на 10 кг массы животного.

Перед применением суспензию во флаконе следует тщательно взболтать. Для достижения максимального профилактического эффекта и снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, в неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах препарат следует назначать животным до появления в стаде первых клинических признаков заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применение препарата дойным коровам, ввиду его выделения с молоком; не следует применять препарат взрослому крупному рогатому скоту с развитым рубцовым пищеварением.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочных явлений и осложнений у животных при применении Эспакоккса 5% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Эспакокс 5% не следует применять одновременно с другими антикокцидийными препаратами. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствуют. Убой поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 91 сутки, телят — не ранее, чем через 70 суток после применения Эспакокса 5%. В случае вынужденного убоя птиц ранее установленных сроков, мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 5 лет со дня производства, после вскрытия упаковки — 3 месяца.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Пластиковый флакон с навинчиваемой крышкой из полипропилена 250 мл.

Купить → <http://vetlikar.com/shop/antigelmintiki-i-protivoparazitnye/yespakoks-5/>