

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№3994-01-1162-08
від 24.12.2008 р.

ЛИСТІВКА – ВКЛАДКА
(настанова по застосуванню)
Колісултрікс
(порошок для орального застосування)

Опис

Гігроскопічний порошок від білого до жовтуватого кольору.

Склад.

100 г препарату містить діючі речовини:

| | |
|-----------------------------|------------|
| триметоприм | 3,75 г |
| колістин (у формі сульфату) | 50 млн. МО |

Інші інгредієнти: підготовлений кварц, менадіон натрію, бісульфіт, моногідрат лактози.

Фармакологічні властивості.

Колістин є поліпептидним антибіотиком, який належить до групи поліміксинів. Його дія спрямована проти грамнегативних бактерій. Він може діяти як бактеріостатично, так і бактеріцидно. Ця дія є можливою завдяки здатності молекули прикріплюватись до бактеріальної мембрани та пригнічувати функцію напівпроникного осмотичного бар'єру. Колістин ефективний переважно проти грамнегативних мікроорганізмів, таких як: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*.

Триметоприм належить до діамінопіримідинів. Він діє проти грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів. Триметоприм інгібує редуктазу дигідрофолатів - ферментів, необхідних для синтезу бактеріальних нуклеопротейнів. В комбінації з колістином він діє проти більшого спектру грамнегативних організмів. Бактеріцидно діє проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*, *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Bordetella spp.* та інші).

Застосування.

Лікування телят, овець, кіз, свиней, домашньої птиці (курчата, кури, індики), кролів при захворюваннях травного каналу, які спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину та триметоприму.

Дозування

Пероарльно з питною водою у дозі:

домашня птиця (курчата, кури,індики): 75 000 МО колістину на кг маси тіла на добу та 10мг триметоприму на кг маси тіла на добу протягом 3-5 діб, або 1- 2,5 г Колісултріксу на літр питної води на добу (не перевищуючи 1г на літр - для молодої птиці на початку відгодівлі) протягом 3 діб.

телята, вівці, кози, свині, кролі: 50 000 МО колістину на кг маси тіла кожні 12 годин та 5 мг триметоприму на кг маси тіла кожні 12 годин протягом 3 діб, або 1-1,25 г Колісултріксу на 10 кг маси тіла двічі на добу (не перевищуючи 30 г препарату на одну тварину на добу) протягом трьох діб.

Протипоказання.

Не застосовувати при підвищеній чутливості до колістину та триметоприму, а також тваринам з порушенням функції нирок та печінки. Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких використовують в їжу людям, в період яйцenessності чи в період до 4 тижнів до початку кладки яєць.

Застереження.

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяється через 7 днів після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Людам з підвищеною чутливістю до поліміксинів потрібно уникати контакту з цим ветеринарним лікарським засобом.

Після застосування препарату потрібно вимити водою з милом руки або ділянки шкіри, на які потрапив препарат. При випадковому потраплянні препарату в очі потрібно ретельно промити очі водою.

Форма випуску.

Поліетиленово-алюмінієво-паперовий пакет по 100 г.

Високощільна поліетиленова коробка по 1 кг.

Поліпропіленова капсула по 1 кг.

Картонно-алюмінієво-поліетиленовий пакет по 1 кг.

Поліпропіленове відро по 2.5 кг.

Поліетиленовий пакет по 2.5 кг.

Поліетиленово-паперовий пакет по 5 кг, 25 кг.

Зберігання.

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15° до 25°C.

Термін придатності — 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Реєстраційний номер:

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту: КООФАВЕТ С.А.С., Франція.