

від 28.02.2008 р.

**Листівка-вкладка  
(настанова до застосування)**

**Кламоксил LA  
(суспензія для ін'єкцій)**

**Опис**

Суспензія білого кольору.

**Склад**

1мл препарату містить діючу речовину:

амоксациліну тригідрат -150.0 мг.

Інші інгредієнти: стеарат алюмінію, фракціонована кокосова олія.

**Фармакологічна дія**

Амоксицилін є антибіотиком широкого спектру дії, що належить до бета-лактам мої групи. Це напівсинтетичний пеніцилін, чутливий до дії пеніцилінази.

Амоксицилін порушує синтез бактеріальної клітинної стінки шляхом інгібування ензимів транспептидази та карбоксипептидази, що викликає осмотичний дисбаланс та загибель бактерії у фазі росту. Амоксицилін виявляє активність проти грампозитивних та грамнегативних бактерій; *Actinobacillus lignieresii*, *Actinobacillus equuli*, *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli* (окрім штамів, виробляючих бета-лактамазу), *Corynebacterium* spp., *Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Moraxella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus mirabilis* (окрім штамів, виробляючих бета-лактамазу), *Salmonella* spp., *Actinomyces bovis*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Streptococci*, *Staphylococci* (окрім штамів, виробляючих бета-лактамазу).

**Застосування**

Лікування великої рогатої худоби, овець, свиней, собак та котів при захворюваннях травного каналу (ентерити), органів дихання (пневмонії, бронхопневмонії) та сечостатевої системи (цистити, метрити), суглобів, шкіри та м'яких тканин, а також для попередження післяопераційних інфекцій, які спричинені мікроорганізмами чутливими до амоксициліну.

**Дозування**

Внутрішньом'язево, підшкірно.

Рекомендована доза - 15 мг діючої речовини на кг маси тіла тварини, або 1,0 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини. Доза може бути повторена після 48 годин.

У таблиці приведено дозування для різних видів тварин.

Вид тварини	Маса тіла тварини (кг)	Доза препарату (мл)
Велика рогата худоба	450	45.0
Бички-відгодівля	200	20.0
Телята	50	5.0
Вівці	65	6.5
Ягнята	10	1.0
Свиноматки	150	15.0
Поросята-відгодівля	70	7.0
Підсвинки	7	0.7
	35	3.5
Собаки великих порід		
Собаки середніх порід	20	2.0
Собаки малих порід	10	1.0
Коти	5	0.5

Перед застосуванням флакон з препаратом ретельно струшують. Вводять препарат внутрішньом'язево або підшкірно, після застосування роблять масаж на місці ін'єкції. Якщо доза препарату більша, ніж 20 мл, то вона має бути розділена на дві частини та введена у два різні місця. Суспензія не вводиться внутрішньовенно.

### **Протипоказання**

Не застосовувати кролям, хом'якам, мурчакам та іншим дрібним травоядним тваринам., а також тваринам чутливим до амоксициліну.

Не вводити внутрішньовенно. Не застосовувати лактуючим вівцям, молоко яких споживається в їжу людям. Телятам та ягнятам препарат може бути застосован орально чи парентерально.

### **Застереження**

Забій тварин па м'ясо та споживання молока в їжу людям дозволяється, відповідно, через 21 та 4 доби після останнього застосування препарату. Залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко згодують непродуктивним тваринам або утилізують.

Пеніциліни та цефалоспорины можуть спричинити гіперчутливість (алергію) після контакту з препаратами. Гіперчутливість до пеніцилінів може призводити до виникнення перехресних реакцій з цефалоспоринами та навпаки. Алергічні реакції на ці речовини можуть бути серйозними.

Застосовуйте препарат з обережністю. Якщо відбувся контакт з препаратом і у вас з'явилися симптоми алергії (почервоніння шкіри) зверніться за консультацією до лікаря. Свербіж обличчя, очей чи губ, важке дихання є більш серйозними симптомами і потребують негайної медичної допомоги. Після роботи з препаратом необхідно мити руки.

### **Форма випуску**

Прозорі скляні флакони типу III з гумовою пробкою під алюмінієвою обкаткою 100мл та 250 мл.

### **Зберігання**

Суше, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15 ° до 25 °С .

Після першого відбору з флакону, препарат необхідно використати протягом 28 діб.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**