

Кобактан 2,5%
(суспензія для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Олійна суспензія білого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

цефквіному сульфат - 29,64 мг (еквівалентно 25 мг цефквіному).

Допоміжні речовини: етилолеат.

Фармакологічні властивості

Цефквіному сульфат - антибіотик, який належить до групи цефалоспоринів IV покоління.

Він пригнічує синтез стінки мікробної клітини. Бактерицидно діє проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (*E. coli*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Prevotella spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Serratia marcescens*, *Haemophilus somnus*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*).

Застосування

Велика рогата худоба: лікування тварин, хворих на панарицій, виразку копитної підшви, гнійний пододерматит, некробацильоз між пальцями копита, мастит, септицемію, а також при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до цефквіному.

Свині: лікування тварин, хворих на синдром ММА (мастит-метрит-агалактія), артрит, менінгіт, епідерміт, а також при захворюваннях органів дихання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до цефквіному.

Дозування

Внутрішньом'язово у дозі:

велика рогата худоба - 1 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 2 мл препарату на 50 кг маси тіла щодобово протягом 3-5 діб (при маститах курс лікування становить 2 доби);

телята - 2 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 4 мл препарату на 50 кг маси тіла щодобово протягом 3-5 діб;

свині - 2 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 2 мл препарату на 25 кг маси тіла щодобово протягом 3 діб (при синдромі ММА курс лікування становить 2 доби);

поросята - 2 мг цефквіному на кг маси тіла тварини або 2 мл препарату на 25 кг маси тіла щодобово протягом 5 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до цефалоспоринів та В-лактамних антибіотиків.

Застереження

Перед використанням флакон із препаратом необхідно ретельно струсити. Для введення використовувати стерильні інструменти. Кришечку флакона можна проколувати безпечно 25 разів.

Забій тварини на м'ясо дозволяється через 5 (велика рогата худоба) та 3 (свині) доби після останнього застосування препарату. Споживання молока в їжу людям дозволяється через добу після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Флакони зі скла, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 50 мл та 100 мл із пластиковою кришечкою-пломбою.

Зберігання

Суше, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2°C до 25°C. Не заморожувати.

Термін придатності – 24 міс.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Інтервет Інтернешнл Б.В.
Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31,
5830 АА
Боксmeer,
Нідерланди.

Intervet International B.V.
Wim de K6rverstraat 35, P.O.Box 31 5380 AA
Boxmeer,
The Netherlands.

Виробники готового продукту:

Інтервет Інтернешнл ГмбХ
Фельдштрассе 1а, 85716
Унтершлейсхайм,
Німеччина

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim
Germany