

# ДРАКСИН

*Антибактериальное*

*Одна инъекция – полный курс лечения*

*Длительность действия – до 15 дней*

*Максимальная концентрация в легких*

*Уникальная терапевтическая и экономическая эффективность при профилактике в группе*

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Драксин – антибактериальное лекарственное средство в форме раствора для инъекций, содержащее в 1 мл в качестве действующего вещества 100 мг тулатромицина, а в качестве вспомогательных веществ моноиоглицерол и воду. Лекарственное средство по внешнему виду представляет прозрачный бесцветный раствор.

## **ФОРМА ВЫПУСКА**

Драксин выпускают в форме стерильного раствора для инъекций, расфасованного по 100 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками и обкатанные алюминиевыми колпачками.

## **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Тулатромицин – полусинтетический бактериостатический антибиотик группы макролидов, ингибирующий биосинтез белков благодаря селективному связыванию с бактериальной рибосомальной РНК. У свиней тулатромицин быстро резорбируется и медленно выводится из организма. Максимальная концентрация в крови – уже через 30 минут после введения. Выводится препарат почками.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Драксин применяют свиньям для профилактики и лечения бактериальных инфекций органов дыхания, вызываемых *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* и *Mycoplasma hyorheumoniae*, чувствительными к тулатромицину. С лечебно-профилактической целью Драксин применяют при респираторных болезнях бактериальной этиологии свиней в неблагоприятных по заболеванию хозяйствах при выявлении больных животных.

## **ДОЗИРОВКА**

1 мл на 40 кг живой массы однократно внутримышечно. При лечении свиней, масса которых превышает 80 кг, дозу разделяют таким образом, чтобы вводить в одну точку не более 2 мл. Драксин не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами, не рекомендуется назначать одновременно с другими макролидами или линкозамидами.

## **СРОКИ ОЖИДАНИЯ**

Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 30 суток, а мясо в месте введения препарата можно использовать не ранее чем через 68 суток после последнего применения препарата. Если убой животных производят ранее чем через 50 дней после последнего применения препарата, печень и почки утилизируют. После 50 дней печень и почки животных можно использовать в пищу без ограничений. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей или для производства мясокостной муки.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

При температуре от 5° до 25°С в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок годности 3 года. После прокола пробки иглой препарат можно использовать в течение 30 дней.