

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Фертагіл®

### 2. Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

гонадорелін - 0,1 мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт; натрію хлорид; вода для ін'єкцій.

### 3. Фармацевтична форма

Прозора безбарвна рідина.

### 4. Фармакологічні властивості

Гонадорелін - синтетичний аналог натурального гонадотропін-рилізінг гормону, що виробляється гіпоталамусом. Дією на аденогіпофіз спричиняє виділення лютеїнізуючого (LH) та фолікулостимулюючого (FSH) гормонів, що викликає дозрівання фолікулів та овуляцію.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Велика рогата худоба, кролі.

#### 5.2 Показання до застосування

Велика рогата худоба:

- кіста яєчників;
- профілактика затримки овуляції;
- профілактика післяродових патологій яєчників;
- покращання запліднення;

кролі:

- стимуляція овуляції.

#### 5.3 Протипоказання

Не встановлені.

#### 5.4 Побічна дія

Не виявлена.

#### 5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

#### 5.6 Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Не показано використовувати під час вагітності.

#### 5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Обмежень не встановлено.

#### 5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Внутрішньом'язово, одноразово у дозі:

велика рогата худоба:

- кіста яєчників - 5,0 мл;
- профілактика затримки овуляції в день штучного запліднення - 1,0-2,5 мл;
- профілактика післяродових патологій яєчників у перші сорок днів після розтелу - 2,5 мл;

кролі:

- для стимуляції овуляції через два дні після окоту вводять 0,2 мл препарату. Самку кроля запліднюють безпосередньо після введення препарату.

#### 5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Дотримуватись встановленого дозування.

#### 5.10 Спеціальні застереження

Немає.

#### 5.11 Період виведення (каренції)

Немає.

### **5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Дотримуватись правил особистої гігієни та техніки безпеки, що передбачаються при роботі з ветеринарними препаратами.

### **6. Фармацевтичні особливості**

#### **6.1 Форми несумісності**

Немає.

#### **6.2 Термін придатності**

П'ять років.

#### **6.3 Особливі заходи зберігання**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати.

#### **6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування**

Скляні флакони по 5 мл закупорені резиновими пробками, обкатані алюмінієвими ковпачками.

#### **6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Згідно з місцевими вимогами по знешкодженню невикористаних препаратів.

### **7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Інтервет Інтернешнл Б.В.

Intervet International B.V.,

Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31,5830 АА

Wim de Körverstraat 35, P.O.Box 31 5380 AA

Боксмер, Нідерланди

Boxmeer, The Netherlands.

### **8. Назва та місцезнаходження виробника (виробників)**

Інтервет Інтернешнл ГмбХ

Intervet Internationl GmbH

Фельдштрассе 1а, 85716 Унтершляйсхайм,

Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim,

Німеччина

Germany

### **9. Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок (ДНДКІВКД) та постачальника (виробника). Три нерозкриті зразки цієї серії препарату з детальним описом ускладнень надсилають за адресою: Україна, 79019, Львів, вул. Донецька, 11, ДНДКІВКД