

**Листовка-вкладыш  
(Инструкция по применению)  
Флорон, раствор для инъекций 300 мг/мл**

**Описание**

Прозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета.

**Состав**

1 мл препарата содержит действующее вещество:

фторфеникол - 300 мг.

Другие ингредиенты: пропиленгликоль, диметилсульфоксид, макрагол.

**Фармакологические свойства**

Фторфеникол является производным тиамфеникола, в котором гидроксильная группа замещена атомом фтора, что вызывает его антибактериальную активность против ацетилтрансферазо-синтезирующих бактерий, которые являются чувствительными к хлорамфениколу. Это бактериостатический, синтетический антибактериальный препарат широкого спектра действия. Фторфеникол угнетает синтез белков в клетках бактерий. В протоплазме он связывается с 70S-рибосомными субъединица, в которых он подавляет ферментную активность пептидилтрансферазы, уменьшая, таким образом, синтез белков в рибосомах соответствующих бактерий.

Фторфеникол действует против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а именно: *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp*, *Haemophilus spp*, *Proteus spp*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Shigella spp*, *Klebsiella spp*, *Enterobacter spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis* и др.

**Применение**

**Крупный рогатый скот:** лечение интердигитального некробациллеза, кератоконъюнктивита, а также при заболеваниях органов дыхания, вызванных чувствительными к фторфениколу микроорганизмами.

**Свиньи:** лечение заболеваний органов дыхания, вызванных чувствительными к фторфениколу микроорганизмами.

**Дозировка**

Вводят внутримышечно или подкожно в области шеи.

**Крупный рогатый скот:** *внутримышечно* - в дозе 20 мг фторфеникола на кг массы тела (1 мл препарата на 15 кг массы тела) дважды с интервалом 48 часов; *подкожно* - однократно в дозе 40 мг фторфеникола на кг массы тела (2 мл препарата на 15 кг массы тела).

**Свиньи:** в дозе 15 мг фторфеникола на кг массы тела (что равно 1 мл препарата на 20 кг массы тела животного) дважды с интервалом 48 часов.

В обоих случаях доза не должна превышать 10 мл в одно место ввода.

**Противопоказания**

Не применять животным с повышенной чувствительностью к фторфениколу. Не применять животным в период беременности и лактации, а также быкам производителям и хрякам, предназначенным для репродукции.

**Предостережения**

Убой животных на мясо разрешается, через 30 (крупный рогатый скот при внутримышечном применении), 44 (крупный рогатый скот при подкожном применении) и 14 (свиньи) дней после последнего приема препарата. В зависимости от заключения врача ветеринарной медицины, к указанному сроку, мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют.

**Форма выпуска**

Флаконы из темного стекла закрыты резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 50 и 100 мл.

**Хранение**

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5° до 30°С.

Срок годности - 3 года.

**Для применения в ветеринарной медицине!**

Владелец регистрационного удостоверения и производитель готового продукта: КРКА, д.д., Ново место, Словения.