

**Лімоксин-25 спрей**  
**(аерозоль для зовнішнього застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Розчин синього кольору.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини:  
окситетрацикліну гідрохлорид - 25 мг  
генціан віолет - 5 мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, поліетилен глікол-400, ізопропиловий спирт, хлорид магнію, моноетаноламін, вода для ін'єкцій.

**Фармакологічні властивості**

Окситетрациклін – антибіотик з групи тетрациклінів. Механізм дії його полягає у порушенні синтезу білка при взаємодії антибіотика з рибосомами, а також у зменшенні проникливості цитоплазматичної мембрани чутливих мікроорганізмів. Окситетрациклін має широкий спектр дії на грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Brucella* spp., *Haemophilus* spp., *E. coli*, *Pasteurella* spp., *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp.), а також на протозойні (Protozoa), мікоплазми (*Mycoplasma* spp.), актиноміцети, спірохети, рикетсії (*Rickettsia* spp.), хламідії (*Chlamydia*).

Генціан віолет належить до групи барвників має антимікотичну та антибактеріальну дію проти *Staphylococcus* spp. Антисептик діє на грампозитивні мікроорганізми шляхом запобігання нормального синтезу стінки бактеріальних клітин. Крім того генціан віолет дозволяє виділяти оброблену зону.

**Застосування**

Лікування великої рогатої худоби, телят, свиней, кіз та овець при захворюваннях поверхневих шарів шкіри, сосків та копит, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до окситетрацикліну та генціан віолету.

**Дозування**

Перед застосуванням флакон ретельно струшують.

Пошкоджену ділянку обробляють препаратом протягом 1-2 секунди з відстані 15-20 см. Перед нанесенням дану ділянку ретельно очищують від сторонніх тіл, ексудату, некротичного матеріалу. Обробляти пошкоджену ділянку необхідно кожні 12 годин до повного одужання.

**Протипоказання**

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до окситетрацикліну або генціан віолету.

**Застереження**

Немає.

**Форма випуску** Алюмінієвий флакон по 200 мл.

**Зберігання**

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15<sup>0</sup> до 25<sup>0</sup>С.

Термін придатності – 2 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення:**

Інтерхімі веркен «Де Аделаар» Еесті АС Ванапере тее14, Прінгі, Віімсі валд, Харьюмаа 74001 Естонія	<b>Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS</b> Vanapere tee 14, Pringi kula, Vilmsi 74001, Harjumaa Estonia
---	--

**Виробник готового продукту:**

Інтерхімі веркен «Де Аделаар» Еесті АС Ванапере тее14, Прінгі, Віімсі валд, Харьюмаа 74001 Естонія	<b>Interchemie werken “De Adelaar” Eesti AS</b> Vanapere tee 14, Pringi kula, Vilmsi 74001, Harjumaa Estonia
---	--