

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Метрікюр®

2. Склад

1 шприц-туба (19 г) містить діючу речовину:

цефепірину бензатин – 500 мг.

Допоміжні речовини: емульгін В1, цетомакрогол 1000, водна рицинова олія, мігліол 812 N.

3. Фармацевтична форма

Суспензія для внутрішньоматкового застосування.

4. Фармакологічні властивості

АТС –vet класифікаційний код:

QG01 – антибактерійні та антисептичні ветеринарні препарати для застосування в гінекології.

Цефепірин – антибіотик цефалоспоринового ряду з широким спектром дії проти грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів (*E. coli*, *Actinobacillus*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Corynebacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus pyogenes*, *Proteus* spp., *Enterobacter* spp. та інші). Цефепірин стійкий до дії пеніцилінази та активний в анаеробному середовищі. Після одноразового введення концентрація його в ендометрії утримується щонайменше 24 години.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Корови.

5.2 Показання до застосування

Лікування тварин, хворих на підгострі та хронічні ендометрити (не пізніше 14 днів після родів), спричинені чутливими до цефепірину мікроорганізмами.

5.3 Протипоказання

Протипоказаний тваринам з підвищеною чутливістю до цефалоспоринів. Не рекомендується введення препарату з антибіотиками інших груп.

5.4 Побічна дія

Не виявлена.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовують вагітним тваринам.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Внутрішньоматково за допомогою одноразового катетера вводять вміст однієї шприц-туби, що, як правило, є достатнім для повного виліковування тварини.

Для цього з'днують шприц-тубу з катетером, захоплюють шийку матки рукою, фіксують через пряму кишку, обережно вводять катетер зі шприцем через шийку матки в порожнину матки та витискають вмістиме поршнем. При необхідності процедуру повторюють через 48 годин.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не виявлене.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренції)

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 1 добу після останнього застосування препарату. До зазначеного терміну м'ясо згодують непродуктивним тваринам або утилізують (залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини). Для молока період виведення становить 0 днів.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Для запобігання контакту з препаратом (у випадку чутливості до цефалоспоринів), персоналу необхідно вдягати гумові рукавички.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не відомі.

6.2 Термін придатності

3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Сухе темне недоступне для дітей місце при температурі від 15°C до 25 °C.

6.4 Природа і склад контейнера первинного упакування

Картонна коробка, яка містить 10 поліетиленових шприців-тубів по 19 г, упаковані в целофанові пакети у комплекті з одноразовими катетерами та рукавичками.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та контейнери повинні утилізуватися відповідно до місцевих вимог згідно з законом.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Інтервет Інтернешнл Б.В.

Intervet International B.V.

Вім де Корверштраат, 35

Wim de Korverstraat, 35

5831 АН Боксмеєр, Нідерланди

5831 AN Boxmeer, the Netherlands

8. Назва та місцезнаходження виробника (виробників)

Інтервет Інтернешнл Б.В.

Intervet International B.V.

Вім де Корверштраат, 35

Wim de Korverstraat, 35

5831 АН Боксмеєр, Нідерланди

5831 AN Boxmeer, the Netherlands

9. Додаткова інформація