

Окси-100
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

окситетрацикліну гідрохлорид – 100,0 мг

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, магній хлорид, натрій формальдегід сульфоксилат, моноетаноламін, поліетиленгліколь-400, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

Окситетрациклін - антибіотик групи тетрацикліну з бактеріостатичною дією. Активність проявляє проти деяких грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів: *Bordetella spp.*, *Campylobacter spp.*, *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.* та *Streptococcus spp.*, а також найпростіших (*Protozoa*), мікоплазм (*Mycoplasma spp.*), рикетсій (*Rickettsia spp.*) та хламідій (*Chlamydia spp.*). Окситетрациклін інгібує синтез протеїну. Всередині чутливої бактеріальної клітини він незворотно зв'язується з рецепторами 30S субодиниці бактеріальної рибосоми, це заважає зв'язуванню аміноацил-транспортної РНК з акцепторним відділом РНК-рибосомного комплексу. Це фактично зупиняє подовження пептидного ланцюга амінокислотами, перешкоджаючи білковому синтезу.

Застосування

Лікування великої рогатої худоби, телят, овець, кіз та свиней при захворюваннях травного каналу, органів дихання та артритів, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до окситетрацикліну.

Дозування

Внутрішньом'язово або підшкірно у дозі:

дорослі тварини - 1,0 мл препарату на 10-20 кг маси тіла протягом 3-5 діб;

молодняк - 2,0 мл препарату на 10-20 кг маси тіла протягом 3-5 діб.

Якщо доза препарату при введенні перевищує 20 мл - для великої рогатої худоби, 10 мл - для свиней та 5 мл - для овець та кіз, то об'єм ін'єкції розділяють на половину і вводять у різні місця тіла.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окситетрацикліну або будь-якого наповнювача. Не застосовувати тваринам з серйозними порушеннями функції нирок і/або печінки. Не застосовувати одночасно з пеніцилінами, цефалоспоринами та хінолонами.

Застереження

Забій тварин на м'ясо, дозволяється через 12 діб, після останнього застосування препарату. Споживання молока в їжу людям дозволяється через 5 діб після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Флакони з темного скла закриті гумовим корком, під алюмінієву обкатку по 50 та 100 мл.

Зберігання

Темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15⁰ до 25⁰С.

Термін придатності – 3 роки.

Після першого відбору з флакону, препарат необхідно використати протягом 14 діб, за умов зберігання в темному місці при температурі від 2⁰ до 8⁰С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Інтерхеми веркен “Де Аделаар” Есті АС
Ванапере тее 14, Прінгі, Віімсі валд,
Харьюмаа 74001
Естонія

Виробник готового продукту:

Інтерхеми веркен “Де Аделаар” Есті АС
Ванапере тее 14, Прінгі, Віімсі валд,
Харьюмаа 74001
Естонія

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS
Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,
Harjumaa 74001,
Estonia

Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS
Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,
Harjumaa 74001,
Estonia