

Пенстреп-400

Водная суспензия для парентерального применения.

Состав:

Содержится в 1 мл:

Прокаин пенициллин G	200 000 междун. единиц.
Дигидрострептомицина сульфат	200 мг.
Растворитель.	1 мл

Описание:

Комбинация прокаин пенициллина G и дигидрострептомицина обладает аддитивным и, в некоторых случаях, комбинированным действием. Прокаин пенициллин G является пенициллином узкого спектра действия, оказывающим бактерицидное действие против главным образом грамположительных бактерий, таких как бактерия *Campylobacter*, клостридии, коринебактерии, *Erysipelothrix*, гемоглобинофильные бактерии, листерия, бактерия *Pasteurella*, пенициллиназа-негативные стафилококки и стрептококки. Дигидрострептомицин является аминогликозидом, обладающим бактерицидным действием против главным образом грамотрицательных бактерий, таких как кишечная палочка, клебсиелла, бактерия *Pasteurella*, сальмонелла и бактерии рода стафилококки.

Показания:

Артрит, мастит и желудочно-кишечные инфекции, инфекции дыхательных и мочевых путей у телят, крупного рогатого скота, коз, овец и свиней, вызванные чувствительными к пенициллину и дигидрострептомицину микроорганизмами, такими как бактерия *Campylobacter*, клостридии, коринебактерии, кишечная палочка, *Erysipelothrix*, гемоглобинофильные бактерии, клебсиелла, листерия, бактерия *Pasteurella*, сальмонелла, стафилококки и стрептококки.

Противопоказания:

- Гиперчувствительность к пенициллину, новокаину и/или аминогликозидам.
- Назначение животным с серьезным нарушением функции почек.
- Назначение одновременно с тетрациклинами, хлорамфениколом, макролидами и линкозамидами.

Побочные действия:

- Назначение терапевтических доз прокаин пенициллина G может привести к выкидышу у свиноматки.
- Ототоксичность, нейротоксичность или нефротоксичность.
- Аллергические реакции.

Дозировка:

Для внутримышечного применения:

Крупный рогатый скот : 1 мл на 20 кг массы тела в течение 3 дней.

Телята, козы, овцы и свиньи: 1 мл на 10 кг массы тела в течение 3 дней.

Встряхнуть перед использованием и не назначать более 20 мл для крупного рогатого скота, более 10 мл для свиней и более 5 мл для телят, овец и коз на участок инъекции.

Время выведения препарата:

- Для почек : 45 дней.
- Для мяса : 21 день.
- Для молока : 3 дня.

Предупреждение:

Держать в недоступном для детей месте.

Упаковка:

Ампула 50 и 100 мл