

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

Порциліс® Ері+Парво, Porcilis® Ery+Parvo – вакцина інактивована проти бешихи й парвовірозу свиней.

2. Якісний і кількісний склад

Кожна доза вакцини (2 мл) містить:

- антиген *Erysipelothrrix rhusiopathiae*, штам M2, серотип 2 >1 PPD (захисна доза 1 свині);
- парвовірус свиней, штам 014, вирощений на тканинній культурі > 9 log₂ HI одиниць.

Антигени містяться у водному ад'юванті, що містить dl-α-токоферол.

Вакцина також містить 0,05 % формальдегід як інактивант.

3. Фармацевтична форма

Водна емульсія.

4. Імунобіологічні властивості

Вакцина індукує вироблення антитіл в організмі імунізованих тварин що забезпечує захист проти бешихи свиней впродовж не менше 6 місяців та парвовірусної інфекції не менше 12 місяців. Антигени вміщені в водно-олійну емульсію для продовження часу стимуляції імунної системи.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Свині.

5.2. Показання до застосування

Для активної імунізації свиней проти бешихи та парвовірусної інфекції.

5.3. Протипоказання

Немає.

5.4. Побічна дія

Можливе тимчасове підвищення температури тіла. На місці ін'єкції може виникнути незначна припухлість, що самостійно зникає через декілька днів.

5.5. Особливі застереження при використанні

Перед використанням флакони з вакциною ретельно струшують та підігрівають до кімнатної температури (15-25) °C.

5.6. Застосування під час вагітності, лактації

Немає застережень.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Одну дозу (2 мл) вводять шляхом глибокої внутрішньої язової ін'єкції, у ділянку шиї за вушною раковиною.

Програма вакцинації

Захистити тварин проти бешихи та парвовірусної інфекції свиней потрібно до першого парування. Разова вакцинація свиней не пізніше, ніж за 2 тижні до парування є достатньою щоб захистити послідуочу вагітність від ураження парвовірусом свиней. Для вироблення достатнього захисту проти *Erysipelothrrix rhusiopathiae*, як базову вакцинацію рекомендують дворазове введення вакцини. Для цього вакцинацію проводять моновалентною вакциною проти бешихи Порциліс® Ері за 4 тижні перед, або 4 тижні після введення комбінованої вакцини Порциліс® Ері+Парво.

Ревакцинація

Ревакцинують двічі на рік у період лактації, за 2-4 тижні до початку парування згідно з альтернативним розкладом вакцинації Porcilis® Ery, Porcilis® Ery+Parvo, Porcilis® Ery і т.д. так щоб вакцинація компонентом Егу проводилася один раз на 6 місяців, а компонентом Parvo один раз на 12 місяців.

Державний комітет ветеринарної медицини України
Державний науково-контрольний інститут
біотехнологій і штамів мікроорганізмів
Ідентифікаційний код 19024865
ДЕРЖАВНА РЕГСТРАЦІЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ

Продовження додатку 1
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00165-02-14
від 03.04.2014

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не спостерігається ніяких симптомів при введенні подвійної дози.

5.10. Спеціальні застереження

Відкритий флакон із вакциною повинен бути використаний протягом 10 годин.

5.11.Період виведення (каренції)

Нуль днів.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

У разі випадкової самоін'екції необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку або етикетку на даний препарат.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Невідомі.

6.2. Термін придатності

24 місяці. Після відкриття використати протягом 10-ти годин.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Зберігати в темному місці при температурі від 2 °C до 8 °C. Не заморожувати! Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

6.4. Природа і склад контейнера первинного пакування

Скляні флакони (тип II), закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 20 мл та 50 мл, 100 мл, 250 мл препарату.

6.5. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Інтервет Інтернейшнл Б.В., Вім де Корверштаат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

6.6. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Невикористаний і протермінований препарат утилізують шляхом кип'ятіння впродовж 30 хвилин, або спалюють.

6.7. Правила відпуску

Без рецепту. Застосовувати препарат може лише лікар (фельдшер) ветеринарної медицини.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнологій і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламиацій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.