

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

Порциліс® Парво, Porcilis® Parvo – вакцина інактивована проти парвовірусної інфекції свиней.

2. Якісний і кількісний склад

Кожна доза вакцини (2 мл) містить активний компонент:

парвовірус свиней, штам 014, вирощений на культурі клітин, інактивований β-пропіолактоном не менше ніж 9 log₂ в РЗГА*

Вакцина містить залишки формальдегіду як консерванту та сліди антибіотиків.

* визначають в тесті на дослідження антитіл у мурчаків.

3. Фармацевтична форма

Емульсія.

4. Імунобіологічні властивості

Антигени вміщені у водний токофероловий ад'ювант для продовження часу стимуляції імунної системи. Напружений імунітет настає на 14 день після щеплення і триває 1 рік.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Свині.

5.2. Показання до застосування

Для імунізації свиноматок та ремонтних свинок з метою захисту ембріонів від парвовірусної інфекції.

5.3. Протипоказання

Не вакцинувати хворих свиней.

5.4. Побічна дія

Можливе тимчасове підвищення температури тіла, на місці ін'єкції може виникнути незначна припухлість. Ці ознаки самостійно зникають протягом декількох днів.

5.5. Особливі застереження при використанні

Перед використанням флакони з вакциною ретельно струшують та підігрівають до кімнатної температури (15-25) °С. Для щеплення використовувати стерильне обладнання.

5.6. Застосування під час вагітності, лактації

Ризик виникнення абортів дуже низький, не більший ніж при застосуванні інших вакцин.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Можна поєднувати із застосуванням вакцини проти хвороби Ауескі, виробництва компанії Інтервет Інтернешнл Б.В.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Одну дозу (2 мл) вводять шляхом глибокої внутрішньом'язової ін'єкції, у ділянку шиї за вушною раковиною.

Програма вакцинації

Ремонтних свинок вакцинують одноразово між 8 та 2 тижнями до першого осіменіння.

Свиноматок вакцинують одноразово не менше ніж за 2 тижні до осіменіння.

Ревакцинація

Ревакцинують перед кожним другим осіменінням, тобто через кожні 5-6 місяців.

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не спостерігається ніяких симптомів захворювання після введення подвійної дози.

5.10. Спеціальні застереження

Відкритий флакон із вакциною повинен бути використаний протягом 10 годин.

5.11 Період виведення (каренції)

Нуль днів.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами. У разі випадкового самовведення вакцини звернутися до лікаря і пред'явити листівку-вкладку.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Невідомі, тому не рекомендуємо одночасно з вакциною застосовувати інші фармацевтичні засоби.

6.2. Термін придатності

24 місяці. Після відкриття використати протягом 10-ти годин.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Зберігати в темному місці при температурі від 2°C до 8°C. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей, місці.

6.4. Природа і склад контейнера первинного пакування

Флакони із гідролітичного скла (тип II) або поліетилену терефталату (PET), закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 10, 25 та 50 доз вакцини.

6.5. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення і виробника

Интервет Интернешнл Б.В., Вім де Корверштраат 35, П.О. Бокс 31, 5830 АА Боксмеер, Нідерланди.

6.6. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний і протермінований препарат утилізують шляхом кип'ятіння або спалювання.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.