

Соликоккс®

раствор для орального применения

- Соликоккс® действует на все виды кокцидий у птиц, свиней, кролей, крупного и мелкого рогатого скота.
- Его противоккокцидиозная активность выше, чем у любого другого современного кокцидиостатика.
- Соликоккс® – малотоксичный препарат. Многократная передозировка не приводит к отравлению.
- Соликоккс® сочетается с любыми другими ветеринарными препаратами. Его можно применять в условиях повышенной температуры и влажности, в условиях теплового стресса.

Описание

Прозрачный раствор.

Состав

1 мл препарата Соликоккс® содержит действующее вещество:

диклазурил - 2,5 мг;

вспомогательные и формообразующие вещества – до 1 мл.

Фармакологические свойства

Диклазурил, который входит в состав препарата Соликоккс®, относится к малотоксичным веществам. Он действует на все виды кокцидий у птиц (*Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. adenoeides*, *E. gallopavonis*, *E. meleagridis* и др.), кролей (*E. flavescens*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedai* и др.), крупного и мелкого рогатого скота, свиней (*Isospora suis*). Наиболее чувствительные к препарату неполовые стадии эндогенного цикла развития кокцидий. Диклазурил не вызывает отрицательных последствий даже при превышении рекомендованных доз в 25-50 раз. Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действиями, его можно применять с любыми кормовыми добавками, антибиотиками, кокцидиостатиками. Препарат термостабильный, эффективный в очень маленьких дозах, не накапливается в органах и тканях животных.

Применение

Лечение кокцидиозов у птицы, кролей, телят, ягнят, козлят, свиней.

Дозирование

Птица: 0,4 мл на 1 кг массы тела, что приблизительно соответствует 2 мл на 1 л питьевой воды в сутки на протяжении 2 суток. Соликоккс® задают в нерастворенном виде через медикатор, или растворяют водой в соотношении не менее 10 л воды на 1 л Соликоккса®;

Кроли, телята, ягнята, козлята: 0,4 мл на 1 кг массы тела в сутки с питьевой водой на протяжении 2 суток, что соответствует 1 мг действующего вещества на 1 кг массы тела в сутки. Соликоккс® задают в нерастворенном виде или растворяют водой в соотношении не менее 10 л воды на 1 л Соликоккса®;

Поросята: 2 мл на 1 кг массы тела непосредственно через рот однократно.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Предостережения

Препарат с водой необходимо задавать не менее 12 часов в сутки. При растворении препарата Соликоккс® в воде необходимо препарат добавлять в воду, а не наоборот.

Период ожидания (каренция)

Пять суток.

Форма выпуска

Упаковка, содержащая 10 полиэтиленовых флаконов по 10 мл и полиэтиленовые флаконы по 1000 мл.

Хранение

Препарат Соликоккс® хранят в транспортной таре, в крытых складских помещениях, в темном, сухом месте при температуре от +5 до +25°C. Срок годности – 2 года.