

Спелимикс® 44

Нерастворимый в воде порошок

- Спелимикс® 44 является антимикробным препаратом широкого спектра действия
- Эффективен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов
- Эффективен при смешанных и хронических инфекциях, против которых неэффективны другие антибиотики
- Повышает сохранность поголовья и увеличивает эффективность кормления

Описание

Нерастворимый в воде порошок белого цвета.

Состав

1 г препарата Спелимикс® 44 содержит действующие вещества:

линкомицина гидрохлорид - 22 мг;

спектиномицина сульфат - 22 мг;

Вспомогательные вещества – до 1 г.

Фармакологическое действие

Линкомицин и спектиномицин в комбинации эффективны против грамположительных микроорганизмов (*Actinomyces spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella multocida*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Actinobacillus spp.*, *Bordetella spp.*, *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*), а также против *Lawsonia spp.*, *Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae*, *Vibrio coli* и микоплазм.

Спелимикс® 44 не оказывает токсического влияния на организм животных, не вызывает отрицательных последствий даже при превышении рекомендованных доз в несколько раз.

Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действием.

Применение

Для профилактики и лечения инфекций органов пищеварения и легких, вызванных микроорганизмами, чувствительными к линкомицину и спектиномицину у свиней (например, колибактериоз, сальмонеллез, дизентерия), домашней птицы (например, некротический энтерит), для повышения сохранности поголовья и увеличения эффективности кормления.

Дозирование

Препарат применяют с кормом индивидуально или групповым методом в следующих дозах.

Свиньи:

– Для профилактики задают 1 кг Спелимикс® 44 на 1 т корма в течение 5-7 дней.

– Для лечения задают 2 кг Спелимикс® 44 на 1 т корма в течение 5-7 дней.

Птица:

– Для профилактики задают 0,5 кг Спелимикс® 44 на 1 т корма в течение 5-7 дней.

– Для лечения задают 2 кг Спелимикс® 44 на 1 т корма в течение 5-7 дней.

При необходимости продолжительность профилактики или лечения увеличивают до 21 дня.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Предостережение

Не задают жвачным, лошадям, кролям и морским свинкам. Препарат следует тщательно смешивать с кормом. Рекомендуется сначала смешать его с 3-10 % общего количества корма, а потом смешать полученную смесь с кормом, который остался. Препарат нельзя применять одновременно с эритромицином.

Период ожидания (каренция)

Свиньи – 3 суток, птица – 2 суток.

Форма выпуска

Пакеты из пленочных и фольгированных материалов по 1000 г и мешки по 25 кг.

Хранение

Препарат хранят в транспортной таре, в крытых складских помещениях, в темном, сухом месте при температуре от 0 до + 25°C. Срок годности — 1 год.