

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Суїбікол

2. Склад

1000 г препарату містить діючі речовини:

оксид цинку 300,0 г

сульфагуанідин 200,0 г.

Допоміжні речовини: кислоти лимонної ангідрид, тальк, фруктин, каолін.

3. Фармацевтична форма

Порошок для орального застосування.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування.

Цинк є активатором для більше як 300 ферментів і бере участь у метаболізмі з міддю та магнієм. Відіграє важливу роль у розвитку клітинного гуморального імунітету. В основному вплив цинку можна розділити на 3 важливих пункти:

1. Вплив на смакові та нюхові рецептори.
2. Стимулює і регулює синтез ДНК і РНК клітин.
3. Участь в синтезі гормону росту та соматотропних клітин.

Сульфагуанідин - сульфаніламідний препарат з бактеріостатичною дією на грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми, такі як *E. coli*, *Clostridium spp.*, *Serpulina spp.* та інші. 50% сульфагуанідину всмоктується в травному каналі. Він виводиться через нирки шляхом клубочкової фільтрації та канальцевої секреції. Невелика кількість метаболізується у печінці та виводиться з жовчю.

5.0 Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Поросята (у період відлучення).

5.2 Покази до застосування

Лікування поросят, хворих на діарею, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до сульфагуанідину.

5.3 Протипоказанн

Підвищена чутливість до сульфагуанідину.

5.4 Побічна дія

Можливі алергічні реакції (блювота, кристалурія, неврити).

5.5 Особливі застереження при використанні

Використовувати препарат тільки в період відлучення поросят.

5.6 Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Препарат не застосовують для вагітних та лактуючих тварин.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Активність цинку оксиду зменшується при наявності в кормі високої концентрації кальцію. Прокаїн зменшує ефективність сульфагуанідину. Одночасне застосування фолієвої кислоти знижує ефективність сульфаниламідів.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Перорально з кормом у дозі 1 кг препарату на 100 кг збалансованого корму протягом 10-14 діб.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

У рекомендованих дозах препарат не викликає передозування. Використання цинку оксиду довше 4 тижнів викликає ураження печінки та м'язів.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11. Період виведення (каренції)

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 7 діб після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

5.12. Спеціальні застереження для осіб та обслуговуючого персоналу

Необхідно дотримуватись правил роботи із ветеринарними препаратами.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності

Невідомі.

6.2 Термін придатності

2 роки.

Термін використання після першого застосування 3 місяці.

6.3 Особливі заходи зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15⁰ до 25⁰ С.

6.4 Природа і склад контейнера

Поліетиленові пакети по 1 кг, паперові пакети з поліетиленовою прокладкою по 10 кг.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Усі невикористані матеріали та залишки препарату повинні бути знешкоджені у відповідності з національними вимогами.

7. Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Ветоквінол Біовет Сп з о.о.

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13-14 Косінієров Гданських вул., 66-

13-14 Kosynierów Gdyńskich st.,66-400

400 Гожув Влкп.

Gorzow Wlkp.

Польща

Poland

Тел. +48 95 728 55 62

Tel. +48 95 728 55 62

Факс +48 95 728 55 62

Fax: +48 95 728 55 62

E-mail: info@biowet.com.pl

E-mail: info@biowet.com.pl

8. Назва та місце знаходження виробника готового продукту

Ветоквінол Біовет Сп з о.о.

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.

13-14 Косінієров Гданських вул., 66-

13-14 Kosynierów Gdyńskich st.,66-400

400 Гожув Влкп.

Gorzow Wlkp.

Польща

Poland

Тел. +48 95 728 55 62

Tel. +48 95 728 55 62

Факс +48 95 728 55 62

Fax: +48 95 728 55 62

E-mail: info@biowet.com.pl

E-mail: info@biowet.com.pl

9. Додаткова інформація