



Ветбицилин-5

Описание

Представляет собой порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с водой образует стойкую суспензию.

Состав и форма выпуска:

1 флакон ветбицилина-5 содержит в качестве действующих веществ смесь двух антибиотиков: бензатила бензилпенициллин - 1 200 000 ЕД и бензилпенициллина новокаиновую соль -300 000 ЕД.

Фармакологические свойства:

Ветбицилин- 5 активен в отношении грамположительных микроорганизмов, включая *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus pneumoniae*, *Corynebacterium diphtheriae*, анаэробных спорообразующих палочек, *Bacillus anthracis* и грамотрицательных

микроорганизмов, в том числе *Neisseria meningitidis*, *Actinomyces israelii*, а также в отношении *Treponema spp.* После внутримышечного введения ветбицилин-5 всасывается в кровь и сохраняется в терапевтической концентрации на протяжении 7 – 10 суток. Выводится из организма главным образом с мочой и частично с фекалиями.

Применение

Ветбицилин-5 назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, пушным зверям, кроликам, индейкам, гусям и уткам для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых чувствительными к бензилпенициллину микроорганизмами.

Дозировка

Перед применением во флакон с ветбицилином-5, проколов колпачок и пробку, добавляют 5 – 6 мл воды для инъекций или стерильного изотонического раствора хлорида натрия, флакон тщательно встряхивают до образования гомогенной суспензии, которую немедленно вводят животному глубоко внутримышечно. Полученную суспензию вводят животным однократно в следующих разовых дозах:

Крупному рогатому скоту	10 000 – 15 000 ЕД на 1 кг массы животного
Лошадям	10 000 – 20 000 ЕД на 1 кг массы животного
Мелкому рогатому скоту	15 000 – 20 000 ЕД на 1 кг массы животного
Свиньям	15 000 – 20 000 ЕД на 1 кг массы животного
Пушным зверям	50 000 – 60 000 ЕД на 1 животное
Кроликам	40 000 – 50 000 ЕД на 1 животное
Индейкам, гусям, уткам	100 000 ЕД на 1 кг массы птицы

При необходимости ветбицилин-5 применяют повторно через 7 – 10 суток.

Побочные действия

У гиперчувствительных животных возможны аллергические реакции. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к антибиотикам пенициллинового ряда и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Предостережение

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения ветбицилина-5. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко от дойных животных, полученное в период лечения и в течение семь суток после последнего введения ветбицилина-5, запрещается использовать в пищевых целях. Такое молоко может быть использовано после термической обработки для кормления животных.

Форма выпуска

Стеклянные флаконы по 10 мл.

Хранение

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от 10 °С до 25 °С.

Срок годности - 2 года.

Для применения в ветеринарной медицине!