

Ганаминовит

Описание продукта: Лекарственный препарат в форме порошка для перорального применения для профилактики гиповитаминозов, нарушения белкового обмена и повышения резистентности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

Состав: Ганаминовит в 1 г в качестве действующих веществ содержит: витамина А - 10000 МЕ, витамина Д₃ - 1000 МЕ, витамина Е - 10 мг, витамина В₁ - 2 мг, витамина В₂ - 4 мг, витамина В₆ - 1,5 мг, пантотената кальция - 10 мг, витамина С - 25 мг, витамина К₃ - 1,5 мг, фолиевой кислоты - 500 мкг, никотинамида - 20 мг, биотина - 15 мкг, D, L - метионина - 50 мг, лизина - 50 мг, аланина - 12,96 мг; аргинина - 15,6 мг, аспарагиновой кислоты - 27,8 мг, валина - 27,4 мг, гистидина - 11,8 мг, глицина - 8,0 мг, глутаминовой кислоты - 85 мг, изолейцина - 23,6 мг, лейцина - 35,4 мг, пролина - 39,2 мг, серина - 24 мг, треонина - 18,6 мг, триптофана - 6,4 мг, цистина - 1,9 мг, фенилаланина - 19 мг; а в качестве вспомогательных компонентов: коллоидный кремний диоксид - 10 мг; лактоза до 1 г. По внешнему виду препарат представляет собой мелкий порошок кремового цвета.

Фармакологические свойства: Ганаминовит, благодаря наличию сбалансированного количества витаминов и аминокислот, компенсирует дефицит этих биологически активных веществ в организме животных, возникающий при стрессах, после перенесенных заболеваний, профилактических прививок и дегельминтизации, способствует нормализации обмена веществ при несбалансированном кормлении, положительно воздействует на рост, репродукцию и продуктивность животных.

Показания к применению: Ганаминовит применяют для профилактики гиповитаминозов и нарушений белкового обмена, повышения резистентности организма сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, в период интенсивного использования, несбалансированного кормления, при стрессах, в восстановительный период после заболеваний, для профилактики осложнений при длительном применении лечебных доз антибиотиков, сульфаниламидов и кокцидиостатиков.

Режим дозирования: Применяют животным орально с водой для поения групповым (через систему автопоения) или индивидуальным способом или смешивая с кормом в следующих дозах:

- свиньям и лошадям 0,25 г/л воды для поения или 0,5 г/кг корма в течение 3-5 дней;
- сельскохозяйственной птице 0,125-0,25 г/л воды для поения или 0,25- 0,5 г/кг корма в течение 4-8 дней.

При необходимости курс повторяют через 1-2 месяца.

Противопоказания: Противопоказания не установлены.

Побочные эффекты: При применении Ганаминовита в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственной птицы, как правило, не наблюдается.

Особые указания: Лекарственный препарат совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками. Продукцию от животноводства после применения Ганаминовита можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Условия и сроки хранения: Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года.

Стандартная упаковка: фольгированный пакеты с внутренней поверхностью из полиэтилена 1 кг.